

摘藻堂四庫全書薈要

子部

欽定四庫全書薈要

子部

內經素問卷十五至十七



臣王杰詳校
詳校官主事臣陳本

欽定四庫全書會要卷一萬四百四十一

子部

黃帝內經素問卷十五

唐王冰次注

宋林億等校正


皮部論

經絡論

氣穴論

氣府論

皮部論篇第五十六

新校正云按全元起本在第二卷

黃帝問曰余聞皮有分部脉有經紀筋有結絡骨有度

量其所生病各異別其分部左右上下陰陽所在病之

始終願聞其道歧伯對曰欲知皮部以經脉為紀者諸

經皆然循經脉行止所主則皮部可知諸經謂十二經脉也十二經脉皆同陽明之陽名

曰害蜚蜚生化也害殺氣也殺氣行則生化弭故曰害蜚上下同法視其部中

有浮絡者皆陽明之絡也上謂手陽明下謂足陽明也其色多青則

痛多黑則痺黃赤則熱多白則寒五色皆見則寒熱也

絡盛則入客於經陽主外陰主內陽謂陽絡陰謂陰絡此通言之也手足身

分所見經絡皆然少陽之陽名曰樞持樞謂樞要持謂執持上下同法視

其部中有浮絡者皆少陽之絡也絡盛則入客於經故

在陽者主內在陰者主出以滲於內諸經皆然太陽之

陽名曰關樞

關司外動以靜鎮為事如樞之運動則氣和平也

上下同法視其部

中有浮絡者皆太陽之絡也絡盛則入客於經少陰之

陰名曰樞儒

儒順也守要而順陰陽開闔之用也新校正云按甲乙經儒作樞

上下同

法視其部中有浮絡者皆少陰之絡也絡盛則入客於

經其入經也從陽部注於經其出者從陰內注於骨心

主之陰名曰害肩

心主脉入掖下氣不和則妨害肩掖之動運

上下同法視

其部中有浮絡者皆心主之絡也絡盛則入客於經太

陰之陰名曰關蟄

關閉蟄類使順行藏
校正云按甲乙經蟄作執新

上下同法

視其部中有浮絡者皆太陰之絡也絡盛則入客於經

部皆謂本經絡之所
部分浮謂浮息也

凡十二經絡脉者皮之部也

列陰
陽位

部主於皮故
曰皮之部也

是故百病之始生也必先於皮毛邪中之

則腠理開開則入客於絡脉留而不去傳入於經留而

不去傳入於府廩於腸胃

廩積也聚也

邪之始入於皮也泝

然起毫毛開腠理

泝然惡寒也起謂毛起豎也
腠理皆謂皮空及文理也

其入於

絡也則絡脉盛色變

盛謂盛滿變謂易其常也

其入客於經也則感

虛乃陷下

經虛邪入故曰感虛脉虛氣少故陷下也

其留於筋骨之間寒多

則筋攣骨痛熱多則筋弛骨消肉燂腠破毛直而敗

急攣

也弛緩也消燂也鍼經曰寒則筋急熱則筋緩寒勝為痛熱勝為氣消腠者肉之標故肉消則腠破毛直而敗

也

帝曰夫子言皮之十二部其生病皆何如岐伯曰皮

者脉之部也

脉氣留行各有陰陽氣隨經所過而部主之故云脉之部

邪客於皮則

腠理開開則邪入客於絡脉絡脉滿則注於經脉經脉

滿則入舍於府藏也故皮者有分部不與而生大病也

脉行皮中各有部分脉受邪氣隨則病生非由皮氣而能生也 新校正云按甲乙經不與作不愈全元起本

作不與元起云氣不與經脉和調則氣傷於外邪流入於內必生大病也 帝曰善

經絡論篇第五十七

新校正云按全元起本在皮部論末王氏分

黃帝問曰夫絡脉之見也其五色各異青黃赤白黑不

同其故何也岐伯對曰經有常色而絡無常變也

經行氣故

色見常應於時絡主血故受邪則變而不一矣

帝曰經之常色何如岐伯曰心

赤肺白肝青脾黃腎黑皆亦應其經脉之色也帝曰絡

之陰陽亦應其經乎岐伯曰陰絡之色應其經陽絡之

色變無常隨四時而行也

順四時氣化之行止

寒多則凝泣凝泣

則青黑熱多則淖澤淖澤則黃赤此皆常色謂之無病

五色具見者謂之寒熱

淖澤也澤潤液也謂微濕潤也

帝曰善

氣穴論篇第五十八

新校正云按全元起本在第二卷

黃帝問曰余聞氣穴三百六十五以應一歲未知其所

願卒聞之岐伯稽首再拜對曰窘乎哉問也其非聖帝

孰能窮其道焉因請溢意盡言其處

孰誰也

帝捧手逡巡

而却曰夫子之開余道也目未見其處耳未聞其數而

目以明耳以聰矣

目以明耳以聰言心志通明迥如意也

歧伯曰此所謂

聖人易語良馬易御也帝曰余非聖人之易語也世言

真數開人意今余所訪問者真數發蒙解惑未足以論

也

開氣穴真數庶將解彼蒙昧之疑惑未足以論述深微之意也

然余願聞夫子溢志

盡言其處令解其意請藏之金匱不敢復出

言其處謂穴俞處所

歧伯再拜而起曰臣請言之背與心相控而痛所治天

突與十椎及上紀

天突在頸結喉下同身寸之四寸中夾宛宛中陰維任脉之會低鍼取之

刺可入同身寸之一寸留七呼若灸者可灸三壯按今甲乙經經脉流注孔穴圖經當脊十椎下並無穴目恐是

七椎也此則督脉氣所主之上紀之處次如下
說新校正云按甲乙經天突在結喉下五寸上紀者

胃脘也

謂中脘也中脘者胃募也在上脘下同身寸之一寸居心蔽骨與齊之中手太陽少陽足陽明

三脉所生任脉氣所發也刺可入同身寸之一寸二分若灸者可灸七壯新校正云按甲乙經云任脉之會

也下紀者關元也

關元者少陽募也在齊下同身寸之三寸足三陰任脉之所會刺可入同

身寸之二寸留七呼若灸者可灸七壯

背脊邪繫陰陽左右如此其病前

後痛瀆胃脇痛而不得息不得卧上氣短氣偏痛

新校正云

按別本偏一作滿

脉滿起斜出尻脉絡胃脇支心貫鬲上肩加

天突斜下肩交十椎下

尋此支絡脉泳注病形證悉是督脉支絡自尾骶出各上行斜

絡脇支心貫鬲上加天突斜之肩而下交於七椎
校正云詳自背與心相控而痛至此疑是骨空論文簡

脫誤
藏俞五十穴
也藏謂五藏肝心脾肺腎非兼四形藏
於此

榮俞經合者肝之井也大敦也榮行間也俞太衝也經
中封也合曲泉也大敦在足大指端去爪甲角如韭葉
及三毛之中足厥陰脉之所出也刺可入同身寸之三
分留十呼若灸者可灸三壯行間在足大指之間脉動
應手陷者中足厥陰脉之所流也
經留作流餘所流並作留
刺可入同身寸之六分留
十呼若灸者可灸三壯太衝在足大指本節後同身寸
之二寸陷者中
新校正云按刺腰痛注云本節後內
間同身寸之二寸陷者中動脉應手
足厥陰脉之所
注也刺可入同身寸之三分留十呼若灸者可灸三壯
中封在足內踝前同身寸之一寸半
新校正云按甲
乙經云一寸
陷者中仰足而取之伸足乃得之足厥

陰脈之所行也刺可入同身寸之四分留七呼若灸者可灸三壯曲泉在膝內輔骨下大筋上小筋下陷者中屈膝而得之足厥陰脈之所入也刺可入同身寸之六分留十呼若灸者可灸三壯心包之井者中衝也榮勞宮也俞太陵也經間使也合曲澤也中衝在手中指之端去爪甲角如韭葉陷者中手心主脈之所出也刺可入同身寸之一分留三呼若灸者可灸一壯勞宮在掌中央動脈手心主脈之所流也刺可入同身寸之三分留六呼若灸者可灸三壯太陵在掌後骨兩筋間陷者中手心主脈之所注也刺可入同身寸之六分留七呼若灸者可灸三壯間使在掌後同身寸之三寸兩筋間陷者中手心主脈之所行也刺可入同身寸之六分留七呼若灸者可灸三壯新校正云按甲乙經云灸三壯曲澤在肘內廉下陷者中屈肘而得之手心主脈之所入也刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯脾之井者隱白也榮大都也俞太白也經商丘也

合陰陵泉也。隱白在足大指之端內側去爪甲角如韭葉足太陰脉之所出也。刺可入同身寸之一分留三呼。若灸者可灸三壯。大都在足大指本節後陷者中。足太陰脉之所流也。刺可入同身寸之三分留七呼。若灸者陰脉之所流也。刺可入同身寸之三分留七呼。若灸者可灸三壯。太白在足內側核骨下陷者中。足太陰脉之所注也。刺可入同身寸之三分留七呼。若灸者可灸三壯。商丘在足內踝下微前陷者中。足太陰脉之所刺可入同身寸之四分留七呼。若灸者可灸三壯。陰陵泉在膝下內側輔骨下陷者中。伸足乃得之。足太陰脉之所入也。刺可入同身寸之五分留七呼。若灸者可灸三壯。肺之井者少商也。榮魚際也。俞太淵也。經渠也。三寸澤也。少商在手大指之端內側去爪甲角如韭葉合尺澤也。少商在手大指之端內側去爪甲角如韭葉。手太陰脉所出也。刺可入同身寸之一分留一呼。若灸者可灸三壯。新校正云：按甲乙經作一壯。魚際在者大指本節後內側散脉手太陰脉之所流也。刺可入同身寸之二分留三呼。若灸者可灸三壯。太淵在掌後

陷者中手太陰脉之所注也刺可入同身寸之二分留
二呼若灸者可灸三壯經渠在寸口陷者中手太陰脉
之所行也刺可入同身寸之三分留三呼不可灸傷人
神明尺澤在肘中約上動脉手太陰脉之所入也刺可
入同身寸之三分留三呼若灸者可灸三壯腎之井者
涌泉也榮然谷也俞大谿也經復溜也新校正云按
甲乙經溜作留餘復溜字並同合陰谷也涌泉在足
心陷者中屈足蹠指宛宛中足少陰脉之所出也刺可
入同身寸之三分留三呼若灸者可灸三壯然谷在足
內踝前起大骨下陷者中足少陰脉之所流也刺可入
同身寸之三分留三呼若灸者可灸三壯刺此多見血
令人立饑欲食太谿在足內踝後跟骨上動脉陷者中
足少陰脉之所注也刺可入同身寸之三分留七呼若
灸者可灸三壯復溜在足內踝上同身寸之二寸陷者
中
新校正云按刺腰痛篇注云在內踝後上二寸動
足少陰脉之所行也刺可入同身寸之三分留三

呼若灸者可灸五壯陰谷在膝下內輔骨之後大筋之下小筋之上按之應手屈膝而得之足少陰脉之所入也刺可入同身寸之四分若灸者可灸三壯如是五藏之俞藏各五穴則二十五俞以左古脉具而言之則五十府俞七十二穴府謂六府非兼九形府也俞亦謂井之井者竅陰也榮俠谿也俞臨泣也原丘虛也經陽輔也合陽陵泉也竅陰在足小指次指之端去爪甲角如韭葉足少陽脉之所出也刺可入同身寸之一分留一呼新校正云按甲乙經作三呼若灸者可灸三壯俠谿在足小指次指歧骨間本節前陷者中足少陽脉之所流刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸三壯臨泣在足小指次指本節後間陷者中去俠谿同身寸之一寸半足少陽脉之所注也刺可入同身寸之三寸新校正云按甲乙經作二分留五呼若灸者可灸三壯丘虛在足外踝下如前陷者中去臨泣同身寸

之三寸足少陽脉之所過也刺可入同身寸之五分留
七呼若灸者可灸三壯陽輔在足外踝上新校正云
按甲乙經云外踝上四寸輔骨前絕骨之端如前同身
寸之三分所去立虛同身寸之七寸足少陽脉之所行
也刺可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸三壯陽
陵泉在膝下同身寸之一寸筋外廉陷者中足少陽脉
之所入也刺可入同身寸之六分留十呼若灸者可灸
三壯脾之府胃胃之井者厲兌也榮內庭也俞陷谷也
原衝陽也經解谿也合三里也厲兌在足大指次指之
端去爪甲角如韭葉足陽明脉之所出也刺可入同身
寸之一分留一呼若灸者可灸一壯內庭在足大指次
指外間陷者中足陽明脉之所流也刺可入同身寸之
三分留十呼新校正云按甲乙經云作二十呼若灸
者可灸三壯陷谷在足大指次指外間本節後陷者中
去內庭同身寸之二寸足陽明脉之所注也刺可入同
身寸之五分留七呼若灸者可灸三壯衝陽在足跗上

同身寸之五寸骨間動脉上去陷谷同身寸之三寸足
陽明脉之所過也刺可入同身寸之三分留十呼若灸
者可灸三壯解谿在衝陽後同身寸之二寸半新校
正云按甲乙經作一寸半刺瘡注作三寸半素問二注
不同當從甲乙經之說腕上陷者中足陽明脉之所行
也刺可入同身寸之五分留五呼若灸者可灸三壯三
里在膝下同身寸之三寸髌骨外廉兩筋肉分間足陽
明脉之所入也刺可入同身寸之一寸留七呼若灸者
可灸三壯肺之府大腸大腸之井者商陽也榮二間也
俞三間也原合谷也經陽谿也合曲池也商陽在手大
指次指內側去爪甲角如韭葉手陽明脉之所出也刺
可入同身寸之一分留一呼若灸者可灸三壯二間在
手大指次指本節前內側陷者中手陽明脉之所流也
刺可入同身寸之三分留六呼若灸者可灸三壯三間
在手大指次指本節後內側陷者中手陽明脉之所注
也刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸三壯合

谷在手大指次指歧骨之間手陽明脉之所過也刺可入同身寸之三分留六呼若灸者可灸三壯陽谿在腕中上側兩筋間陷者中手陽明脉之所行也刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯曲池在肘外輔屈肘兩骨之中手陽明脉之所入也以手拱臂取之刺可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸三壯心之府小腸小腸之井者少澤也榮前谷也俞後谿也原腕骨也經陽谷也合少海也少澤在手小指之端去爪甲下同身寸之一分陷者中手太陽脉之所出也刺可入同身寸之一分留二呼若灸者可灸一壯前谷在手小指外側本節前陷者中手太陽脉之所流也刺可入同身寸之一分留三呼若灸者可灸三壯後谿在手小指外側本節後陷者中手太陽脉之所注也刺可入同身寸之一分留二呼若灸者可灸一壯腕骨在手外側腕前起骨下陷者中手太陽脉之所過也刺可入同身寸之二分留三呼若灸者可灸三壯陽谷在手外側腕中銳

骨之下陷者中手太陽脉之所行也刺可入同身寸之
二分留三呼新校正云按甲乙經作二呼若灸者
可灸三壯少海在肘內大骨外去肘端同身寸之五分
陷者中屈肘乃得之手太陽脉之所入也刺可入同身
寸之二分留七呼若灸者可灸五壯心包之府三焦三
焦之井者關衝也榮液門也俞中渚也原陽池也經支
溝也合天井也關衝在手小指次指之端去爪甲角如
韭葉手少陽脉之所出也刺可入同身寸之一分留三
呼若灸者可灸三壯液門在手小指次指間陷者中手
少陽脉之所流也刺可入同身寸之二分若灸者可灸
三壯中渚在手小指次指本節後間陷者中手少陽脉
之所注也刺可入同身寸之二分留三呼若灸者可灸
三壯陽池在手表腕上陷者中手少陽脉之所過也刺
可入同身寸之二分留六呼若灸者可灸三壯支溝在
腕後同身寸之三寸兩骨之間陷者中手少陽脉之所
行也刺可入同身寸之二分留七呼若灸者可灸三壯

天井在肘外大骨之後同身寸之一寸兩筋間陷者中
屈肘得之手少陽脉之所入也刺可入同身寸之一寸
留七呼若灸者可灸三壯腎之府膀胱膀胱之井者至
陰也榮通谷也俞束骨也原京骨也經崑崙也合委中
也至陰在足小指外側去爪甲角如韭葉足太陽脉之
所出也刺可入同身寸之一分留五呼若灸者可灸三
壯通谷在足小指外側本節前陷者中太陽脉之所
流也刺可入同身寸之二分留五呼若灸者可灸三壯
束骨在足小指外側本節後赤白肉際陷者中足太陽
脉之所注也刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可
灸三壯京骨在足外側大骨下赤白肉際陷者中按而
得之足太陽脉之所過也刺可入同身寸之三分留七
呼若灸者可灸三壯崑崙在足外踝後跟骨上陷者中
細脉動應手足太陽脉之所行也刺可入同身寸之五
分留十呼若灸者可灸三壯委中在臍中央約大中動
脉新校正云詳委中穴與甲乙經及刺瘡篇注痺論

注同又骨空論云在膝解之後曲脚之中背面取之又熱穴論注刺熱篇注云在足膝後屈處足太陽脉之

所入刺可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸三壯如是六府之俞府各六穴則三十六俞以左右脉具而

言之則七熱俞五十九穴水俞五十七穴並具水熱論

十二穴云按熱俞又見刺熱篇注頭上五行行五五二十五穴此亦熱俞

也穴中脘兩傍各五凡十六穴謂五藏之背俞也肺俞在第五椎

下兩傍肝俞在第九椎下兩傍脾俞在第十一椎下兩傍腎俞在第十四椎下兩傍此五藏俞者各俠脊相去

同身寸之一寸半並足太陽脉之會刺可入同身寸之三分肝俞留六呼餘並留七呼若灸者可灸三壯俠脊

數之則大椎上兩傍各一凡二穴今甲乙經經脉流注

十穴也

孔穴圖經並不載未

詳何俞也

新校正云按大椎上傍無穴
大椎下傍穴名大杼後有故王氏云未詳

目瞳子浮白

二穴

瞳子膠在目外去眥同身寸之五分手太陽手足少陽三脉之會刺可入同身寸之三

灸三壯浮白在耳後入髮際同身寸之一寸足太陽少陽二脉之會刺可入同身寸之三分若灸者可灸三壯
左古言之各
二為四也
兩髀厭分中二穴
謂環鉞穴也在髀樞後

刺可入同身寸之一寸留二十呼若灸者可灸三壯
新校正云按王氏云在髀樞後按甲乙經云在髀樞中

後當作中灸三壯
甲乙經作五壯

犢鼻二穴

在膝髌下筋上俠解大筋中足陽明脉氣所發刺可

入同身寸之六分
若灸者可灸三壯

耳中多所聞二穴

聽宮穴也在耳中珠子大如赤小豆

手足少陽手太陽
者可灸三壯

新校正云按甲乙經云刺可入同身寸之一分若灸

眉本二穴

刺可入同身寸之三分留六呼若灸者可灸

三壯 **完骨二穴**

在耳後入髮際同身寸之四分足太陽少陽之會刺可入同身寸之三分留七呼若

灸者可灸三壯

新校正云按

頂中央一穴

風府穴也在頂上入

髮際同身寸之一寸大筋內宛宛中督脉陽維二經之會疾言其肉立起言休其肉立下刺可入同身寸之四

分留三呼灸之不幸使人瘡

枕骨二穴

竅陰穴也在完骨上枕骨下搖動應手足太陽少陰之會

刺可入同身寸之三分若灸者可灸三壯

新

上關二

穴鍼經所謂刺之則缺不能欠者也

在耳前上廉起骨

分留七呼若灸者可灸三壯刺深令入耳無所聞

大迎二穴

在曲頰前同身寸之一寸三分骨陷

者中動脉足陽明脉氣所發刺可入同
身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯
下關二穴 鉗經

刺之則欠不能數者也
在上關下耳前動脉下廉合口
有空張口而閉足陽明少陽二脉之會刺可入同身寸

之三分留七呼若灸者可灸三壯耳中有乾槌之
不得灸也
新校正云按甲乙經槌之作槌抵
天柱

二穴 在俠項後髮際大筋外廉陷者中足太陽脉氣所
發刺可入同身寸之二分留六呼若灸者可灸三

壯
巨虛上下廉四穴 上廉足陽明與大腸合也在膝犢
鼻下脘外廉同身寸之六寸足陽

明脉氣所發刺可入同身寸之八分若灸者可灸三壯
下廉足陽明與小腸合也在上廉下同身寸之三寸足

陽明脉氣所發刺可入同身寸之三分若灸者可灸三
壯
新校正云按甲乙經并刺熱篇注水熱穴注上廉

在三里下三寸此云犢鼻下六寸者蓋三里在犢
鼻下三寸上廉又在三里下三寸故云六寸也
曲牙

二穴

明頰車穴也在耳下曲頰端陷者中開口有空足陽明脉氣所發刺可入同身寸之三分若灸者可灸

三壯也

天突一穴

釋也

天府二穴

在腋下同身寸之三寸臂臑內廉動脉手太陰

脉氣所發禁不可灸刺可入同身寸之四分留三呼

天牖二穴

在頸筋間缺盆上天容後天柱前完

骨下髮際上手少陽脉氣所發刺可入同身寸之一寸留七呼若灸者可灸三壯

扶突二穴

在頸

當曲頰下同身寸之一寸人迎後手陽明脉氣所發仰而取之刺可入同身寸之四分若灸者可灸三壯

天

窻二穴

在曲頰下扶突後動脉應手陷者中手太陽脉氣所發刺可入同身寸之六分若灸者可灸三

壯

肩解二穴

謂肩井也在肩上陷解中缺盆上大骨前手少陽陽維之會刺可入同身寸之五

分若灸者可灸三壯
校正云按甲乙經灸五壯

新關元一穴

新校正云詳此已前釋舊當篇再注

今去
委陽二穴

三焦下輔俞也在膈中外廉兩筋間此足太陽之別絡刺可入同身寸之七分

留五呼若灸者可灸
三壯屈身而取之

肩貞二穴

在肩曲胛下兩骨解間肩髃後陷者中手太陽

脉氣所發刺可入同身寸
之八分若灸者可灸三壯

瘖門一穴

在項髮際宛宛中入係舌本督脉陽

維二經之會仰頭取之刺可入同身寸之四分不可灸
灸之令人瘡

新校正云按氣府注云去風府一寸

齊一穴

齊中也禁不可刺刺之使人齊中惡瘍潰矢出者死不可治若灸者可灸三壯

胃俞十

二穴

謂俞府或中神藏靈墟神封步廊左右則十二穴也俞府在巨骨下俠任脉兩傍橫去任脉各同身

寸之二寸陷者中下五穴遞相去同身寸之一寸六分陷者中並足少陰脉氣所發仰而取之刺可入同身寸之四分若灸**背俞二穴**大杼穴也在脊第一椎下兩傍者可灸五壯

中督脉別絡手足太陽三脉氣之會刺可入
同身寸之三分留七呼若灸者可灸七壯

膺俞十二

穴

謂雲門中府周榮胃卿天谿食竇左右則十二穴也
新校正云按甲乙經作周榮胃卿雲門在巨骨下

俠任脉傍橫去任脉各同身寸之六寸
水熱穴注作胃中行兩傍與此丈雖異處所無別
新校正云按

者中動脉應手雲門中府相去同身寸之一寸餘五穴
遞相去同身寸之一寸六分陷者中並手太陰脉氣所

發雲門食竇舉臂取之餘並仰而取之雲門刺可入同
身寸之七分太深令人逆息中府刺可入同身寸之三

分留五呼餘刺可入同身寸之四分若灸者可灸五壯
新校正云詳王氏以此十二穴并手太陰按甲乙經

雲門乃手太陰中府乃手足太陰之會周
榮已下乃足太陰非十二穴並手太陰也
分肉二穴在

外踝上絕骨之端同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯
所發刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯

新校正云按甲乙經無分肉穴詳處所疑是陽輔在足外踝上輔骨前絕骨端如前三分所又按刺腰痛注

作絕骨之端如後二分刺入
踝上橫二穴
內踝上首交信穴也交信

五分留十呼與此注小異
去內踝上同身寸之二寸少陰前太陰後筋骨間足陰

蹻之却刺可入同身寸之四分留五呼若灸者可灸三
壯外踝上附陽穴也附陽去外踝上同身寸之三寸太

陽前少陰後筋骨間陽蹻之却刺可入同身寸之六分
留七呼若灸者可灸三壯
新陰陽蹻四穴
陰蹻穴在

校正云按甲乙經附陽作付陽
是謂照海陰蹻所生刺可入同身寸之四分留六呼若

灸者可灸三壯陽蹻穴是謂申脉陽蹻所生在外踝下
陷者中
新校正云按刺腰痛篇注作在外踝下五分

繆刺論注云外踝下半寸
容爪甲刺可入同身寸之
二分留七呼若灸者可灸三壯
新校正云按
水俞在
甲乙經留七呼作六呼刺腰痛篇注作十呼

諸分

分謂肉之分理
間治水取之

熱俞在氣穴

寫熱則
取之

寒熱俞在兩

骸厭中二穴

骸厭謂膝外俠
膝之骨厭中也

大禁二十五在天府下五

寸

謂五里穴也所以謂之大禁者謂其禁不可刺也
經曰迎之五里中道而上五至而已五注而藏之氣

盡矣故五五二十五而竭其俞矣蓋謂此
也又曰五里者尺澤之後五里與此文同凡三百六十

五穴鍼之所由行也

新校正云詳自藏俞五十至此并
重複共得三百六十穴通前天突

十椎上紀下紀共三百六十五
穴除重複實有三百一十三穴帝曰余已知氣穴之處

遊鍼之居願聞孫絡谿谷亦有所應乎

孫絡小絡也謂
絡之支別者

岐伯曰孫絡三百六十五穴會亦以應一歲以溢奇邪

以通榮衛榮衛稽留衛散榮溢氣竭血著外為發熱內

為少氣疾寫無怠以通榮衛見而寫之無問所會

榮積衛留

內外相薄者見其血絡當即寫之亦無問其脉之俞會

帝曰善願聞谿谷之會也

歧伯曰肉之大會為谷肉之小會為谿肉分之間谿谷

之會以行榮衛以會大氣

新校正云按甲乙經作以舍大氣

邪溢氣壅

脉熱肉敗榮衛不行必將為膿內銷骨髓外破大膿

熱過

故致

留於節湊必將為敗

若留於骨節之間津液所湊之處則骨節之間髓液皆潰

為膿故必爛筋骨而不得屈伸矣

積寒留舍榮衛不居卷肉縮筋

新校正云

按全元起本作寒肉縮筋肋肘不得伸內為骨痺外為不仁命曰不

足大寒留於谿谷也

邪氣盛甚真氣不榮髓溢內消故為是也不足謂陽氣不足也寒邪

外薄久積淹留陽不外勝內消筋髓故曰不足大寒留於谿谷之中也

谿谷三百六十五

穴會亦應一歲其小痺淫溢循脉往來微鍼所及與法

相同

若小寒之氣流行淫溢隨脉往來為痺病用鍼調者與常法相同爾

帝乃辟左右而

起再拜曰今日發蒙解惑藏之金匱不敢復出乃藏之

金蘭之室署曰氣穴所在歧伯曰孫絡之脉別經者其

血盛而當寫者亦三百六十五脉並注於絡傳注十二

絡脉非獨十四絡脉也

十四絡者謂十二經絡兼任脉督脉之絡也脾之大絡起自於

脾故不并言之也

內解寫於中者十脉

解謂骨解之中經絡也雖則別行然所受邪亦

隨注寫於五藏之脉左右各五故十脉也

氣府論篇第五十九

新校正云按全元起本在第二卷

足太陽脉氣所發者七十八穴

兼氣浮薄相通者言之當言九十三穴非七十

八穴也正經脉會發者七十八穴浮薄相通者一十五穴則其數也

兩眉頭各一

謂攢竹穴也所

在刺灸分壯與氣穴同法

入髮至項三寸半傍五相去三寸

謂大杼風門各

二穴也所在刺灸分壯與氣穴同法本云入髮至項三寸又注云寸同身寸也

新校正云按別諸寸同法與

此注全別此注謂大杼風門各二穴所在灸刺分壯與此氣穴同法今氣穴篇中無風門穴而注言與同法此

注之非可見此非王氏之誤誤在後人詳此入髮至頂三寸半傍五相去三寸蓋是說下文浮氣之在皮中五

行行五之穴故王都不解釋直云寸為同身寸也但以頂誤作頂刺半字耳所以言入髮至頂者自入髮顙會

穴至頂百會凡三寸自百會後至後頂又三寸故云入髮至頂三寸傍五者為兼四行傍數有五行也相去三

寸者蓋謂自百會頂中數左右前後各三寸有五行行五共二十五穴也後人誤認將頂為頂以為大杼風門

此甚誤也況大杼在第一椎下兩傍風門又在第二椎下上云髮際非止三寸半也其誤甚明其浮氣

在皮中者凡五行行五五二十五之可以去熱者也

五行謂頭上自髮際中同身寸之二寸後至頂之後者也二十五者其中行則顙會前頂百會後頂強間五督

脉氣也次俠傍兩行則五處承光通天絡却玉枕各五
本經氣也又次傍兩行則臨泣目窻正營承靈腦空各
五足少陽氣也兩傍四行各五則二十穴中行
五則二十五也其刺灸分壯與水熱穴同法

項中大

筋兩傍各一

灸謂天柱二穴也所在刺

風府兩傍各一

謂

池二穴也刺灸分壯與氣穴同法
經風池足少陽陽維之會非太陽之所發也經言風府
兩傍乃天柱穴之分位此亦復明上項中大筋兩傍穴
也此注刺出風池二穴於九十三數外更刺前大杼風

門及此風池六穴也

俠背以下至尻尾二十一節十五間各一

五

間各一者今中誥孔穴圖經所存者十三穴左右共一
十六謂附分魄戶神堂譙譙萬關魂門陽綱意舍胃倉
脊門志室胞育秩邊十三也附分在第二椎下附項內
廉兩傍各相去俠脊同身寸之三寸足太陽之會刺可

入同身寸之八分若灸者可灸五壯魄戶在第三椎下
兩傍上直附分足太陽脉氣所發下十二穴並同正坐
取之刺可入同身寸之五分若灸者如附分法神堂在
第五椎下兩傍上直魄戶刺可入同身寸之三分灸同
附分法譙謔在第六椎下兩傍上直神堂新校正云
按骨空論注云以手厭之令病人呼譙謔之聲則指下
動矣刺可入同身寸之六分留七呼灸如附分法鬲
關在第七椎下兩傍上直譙謔正坐開肩取之刺可入
同身寸之五分若灸者可灸三壯新校正云按甲乙
經可灸五壯魂門在第九椎下兩傍上直鬲關正坐
取之刺灸分壯如鬲關法陽綱在第十椎下兩傍上直
魂門正坐取之刺灸分壯如魂門法意舍在第十一椎
下兩傍上直陽綱正坐取之刺灸分壯如陽綱法胃倉
在第十二椎下兩傍上直意舍刺灸分壯如意舍法育
門在第十三椎下兩傍上直胃倉刺同胃倉可灸三十
壯新校正云按育門灸三十壯與甲乙經同水穴注

作灸三壯 志室在第十四椎下兩傍上直育門正坐取之刺灸分壯如魄戶法胞育在第十九椎下兩傍上直

志室伏而取之刺灸分壯如魄戶法 新校正云按

志室胞育灸如魄戶五壯甲乙經作三壯水穴注亦作

三壯熱穴注志室亦作三壯 袂邊在第二十一椎

下兩傍上直胞育伏而取之刺灸分壯如魄戶法 **五藏**

之俞各五六府之俞各六

肺俞在第三椎下兩傍俠脊相去各同身寸之一寸半刺

可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯心俞在

第五椎下兩傍相去及刺如肺俞法留七呼肝俞在第九

椎下兩傍相去及刺如心俞法留六呼脾俞在第十一

椎下兩傍相去及刺如肝俞法留七呼腎俞在第十四

椎下兩傍相去及刺如脾俞法留七呼膽俞在第十五

下兩傍相去如肺俞法正坐取之刺可入同身寸之五

分留七呼胃俞在第十二椎下兩傍相去及刺如脾俞

法留七呼三焦俞在第十三椎下兩傍相去及刺如膽

俞法大腸俞在第十六椎下兩傍相去及刺如肺俞法
留六呼小腸俞在第十八椎下兩傍相去及刺如心俞

法留六呼膀胱俞在第十九椎下兩傍相去及刺如腎
俞法留六呼五藏六府之俞若灸者並可灸三壯新

校正云詳或者疑經中各五各六以各字為誤者非也
所以言各者謂左右各五各六非謂每藏府而各五各

六委中以下至足小指傍各六俞謂委中崑崙京骨束
骨通谷至陰六穴也

左右言之則十二俞也其所在刺灸如氣穴法經言脉
氣所發者七十八穴今此所有兼亡者九十三穴由此

則大數差錯傳寫有誤也新校正云詳王氏云兼亡
者九十三穴今兼大杼風門風池為九十九穴以此王

氏揔數計之明知此足少陽脉氣所發者六十二穴兩

角上各二謂天衝曲鬢左右各二也天衝在耳上如前
同身寸之三分足太陽少陽二脉之會刺可

入同身寸之三分若灸者可灸五壯曲鬢在耳上入髮際曲陽陷者中鼓頷有空足太陽少陽二脉之會刺灸

分壯如直目上髮際內各五

謂臨泣目窓正營承靈腦空左右是也臨泣在頭直目

天衝法
上入髮際同身寸之五分足太陽少陽陽維三脉之會
留七呼目窓在臨泣後同身寸之一寸正營在目窓後
同身寸之一寸承靈在正營後同身寸之一寸半腦空
在承靈後同身寸之一寸半俠枕骨後枕骨上並足少
陽陽維二脉之會刺可入同身寸之四分餘並刺可入
同身寸之三分若灸者並可灸五壯新校正云按腦
空在枕骨後枕骨上
甲乙經作玉枕骨下
耳前角上各一
謂額厭二穴也在
曲角下顙額之上
上廉手足少陽足陽明三脉之會刺可入同身寸之
七分留七呼若灸者可灸三壯刺深令人耳無所聞
耳

前角下各一

謂懸釐二穴也在曲角上顙額之下廉手
足少陽陽明四脉之交會刺可入同身寸

之三分留七呼若灸者可灸三壯新校正云按後手少陽中云角上此云角下必有一誤銳髮下

各一謂和髻二穴也在耳前銳髮下橫動脉手足少陽二脉之會刺可入同身寸之三分若灸者可灸三

壯手足少陽手太陽之會也客主人各一客主人穴名也在耳前上

廉起骨開口有空手足少陽足陽明三脉之會刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯新校正云

按甲乙經及氣穴注刺禁注並耳後陷中各一謂翳風云手少陽足陽明之會與此異二穴也

在耳後陷者中按之引耳中手足少陽二脉之會刺可入同身寸之三分若灸者可灸三壯下關各

一下關穴名也所在耳下牙車之後各一謂頰車二穴也刺灸分壯

氣穴同法缺盆各一缺盆穴名也在肩上橫骨陷者中足陽明脉氣所發刺可入同身寸之二分留

七呼若灸者可灸三壯太深令人逆
息新校正云按骨空注作手陽明
掖下三寸脇下至

肱八間各一

掖下三寸同身寸也掖下謂淵掖輒筋天
池脇下至肱則日月章門帶脉五樞維道

居髀九穴也左右共十八穴也淵掖在掖下同身寸之
三寸足少陽脉氣所發舉臂得之刺可入同身寸之三

分禁不可灸輒筋在掖下同身寸之三寸復前行同身
寸之一寸撻脇新校正云按甲乙經撻作著下同

足少陽脉氣所發刺可入同身寸之六分若灸者可灸
三壯天池在乳後同身寸之二寸新校正云按甲乙

經作一寸掖下三寸撻脇直掖掖肋間手心主足少陽
二脉之會刺可入同身寸之三分新校正云按甲乙

經作七分若灸者可灸三壯日月膽募也在第三肋
端橫直心蔽骨傍各同身寸之二寸五分上直兩乳

新校正云按甲乙經云日月在期門下五分足太陰
少陽二脉之會刺可入同身寸之七分若灸者可灸五

壯章門脾募也在季肋端足厥陰少陽二脉之會側卧
屈上足伸下足舉臂取之刺可入同身寸之八分留六
呼若灸者可灸三壯帶脉在季肋下同身寸之一寸八
分足少陽帶脉二經之會刺可入同身寸之六分若灸
者可灸五壯五樞在帶脉下同身寸之三寸足少陽帶
脉二經之會刺可入同身寸之一寸若灸者可灸五壯
維道在章門下同身寸之五寸三分足少陽帶脉二經
之會刺灸分壯如章門法居髀在章門下同身寸之四
寸三分髀骨上新校正云按甲乙經作監骨陷者
中陽蹻足少陽二脉之會刺灸分壯如維道法所以謂
之八間者自掖下三
髀樞中傍各一
寸至季肋凡八肋骨
謂此穴在髀樞中也傍各一者謂左右
各一穴也非謂環鈹在髀樞中傍也
膝以下至足小
又甲乙經注環鈹在髀樞中今云髀樞中傍各一者蓋
謂此穴在髀樞中也傍各一者謂左右
各一穴也非謂環鈹在髀樞中傍也

指次指各六俞

謂陽陵泉陽輔丘虛臨泣俠谿竅陰六穴也左右言之則十二俞也其所在刺

灸分壯氣穴同法

足陽明脉氣所發者六十八穴額顙髮際傍

各三

謂懸顙陽白頭維左右共六穴也正面髮際橫行數之懸顙在曲角上顙顙之中足陽明脉氣所發

刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸三壯陽白在眉上同身寸之一寸直瞳子足陽明陰維二脉之會刺可入同身寸之三分灸三壯頭維在額角髮際俠本神兩傍各同身寸之一寸五分足少陽陽明二脉之交會刺可入同身寸之五分禁不可灸新校正云按甲乙經陽白足少陽陽維之會今王氏注云足陽明陰維之會詳此在足陽明脉氣所發中則足陽明近是然陽明經不到此又不與陰維會疑王注非甲乙經為得矣

面髃骨空各一

謂四白穴也在目下同身寸之一寸足陽明脉氣所發刺可入同身寸之四分

不可灸 新校正云按甲乙經刺入三分灸七壯

大迎之骨空各一

大迎穴名也在曲頷

前同身寸之一寸三分骨陷者中動脉足陽明脉氣所發刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯

人迎各一

人迎穴名也在頸俠結喉傍大脉動應手足陽明脉氣所發刺可入同身寸之四分過深

殺人禁 缺盆外骨空各一

謂天髀二穴也在肩缺盆中上伏骨之陷陷者中手足少

陽陽維三脉之會刺可入同身寸之八分若灸者新校正云按甲乙經伏骨作毖骨

膺中

骨間各一

謂膺憲等六穴也膺憲在胃兩傍俠中行各相去同身寸之四寸巨骨下同身寸之四寸

八分陷者中足陽明脉氣所發仰而取之刺可入同身寸之四分若灸者可灸五壯此穴之上又有氣戶庫房屋翳下又有乳中乳根氣戶在巨骨下下直膺憲去膺憲上同身寸之四寸八分庫房在氣戶下同身寸之一

寸六分屋翳在氣戶下同身寸之三寸二分下即膺窓也膺窓之下即乳中也乳中穴下同身寸之一寸六分陷者中則乳根穴也並足陽明脉氣所發仰而取之乳中禁不可灸刺灸刺之不幸生蝕瘡瘡中有清汁膿血者可治瘡中有瘰肉若蝕瘡者死餘五穴並刺可入同身寸之四分若灸者可灸三壯

灸五壯

俠鳩尾之外當乳下三寸俠胃脘各五

謂不容承滿梁門關

門太一五穴也左右共一寸也俠腹中行兩傍相去各同身寸之四寸

新校正云按甲乙經云各二寸疑此

注刺各字不容在第四肋端下至太乙各上下相去同身寸之一寸並足陽明脉氣所發刺可入同身寸之八

分若灸者可灸五壯

新校正云按甲乙經

俠齊廣三

寸各三

廣謂去齊橫廣也廣三寸者各如太一之遠近也各三者謂滑肉門天樞外陵也滑肉門在太

一下同身寸之一寸天樞在滑肉門下同身寸之一寸正當於齊外陵在天樞下同身寸之一寸並足陽明脉

氣所發天樞刺可入同身寸之五分留七呼滑肉門外陵各刺可入同身寸之八分若灸者並可灸三壯新

校正云按甲乙經天樞在齊傍各二寸上曰滑肉門下曰外陵是三穴者去齊各二寸也今此經注云廣三寸

素問甲乙經不同然甲乙經分寸與諸書同特此經為異也下齊二寸俠之各三寸齊下

二寸則外陵下同身寸之一寸大巨穴也各三者謂大巨水道歸來也大巨在外陵下同身寸之一寸足陽明

脉氣所發刺可入同身寸之八分若灸者可灸五壯水道在大巨下同身寸之三寸足陽明脉氣所發刺可入

同身寸之二寸半若灸者可灸五壯歸來在水道下同身寸之二寸刺可入同身寸之八分若灸者可灸五壯

氣街動脉各一氣街穴名也在歸來下鼠鼯上同身寸之一寸脉動應手足陽明脉氣所發刺

可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯新校
正云詳此注與甲乙經同刺熱注及熱穴注云氣街在
腹臍下橫骨兩端鼠鼯上刺禁論注在腹下俠齊兩傍
相去四寸鼠僕上骨空注云在毛際兩傍鼠鼯上諸注
不同今伏菟上各一謂髀關二穴也在膝上伏菟後交
備錄之者可灸
三里以下至足中指各八俞分之所在穴空謂

三里上廉下廉解谿衝陽陷谷內庭厲兌八穴也左右言
之則十六俞也上廉足陽明與大腸合下廉足陽明與
小腸合也其所在刺灸分壯與氣穴同法所謂分之所
在穴空者足陽明脉自三里穴分而下行其直者循胫
過跗入中指出其端則厲兌也其支者與直俱行至足
跗上入中指次間故云分之所在穴空也之往也言分
而各行往指手太陽脉氣所發者三十六穴目內眥各
間穴空處也

一謂睛明二穴也在目內眥手足太陽足陽明陰陽

可灸三壯諸穴有云數脉會發而不於目外各一謂瞳

二穴也在目外眥同身寸之五分手太陽手足少陽

三脉之會刺可入同身寸之三分若灸者可灸三壯

耳郭上各一謂角孫二穴也在耳上郭表之

者可灸三壯新校正云按甲乙經手太陽作手陽明

耳中各一謂聽宮二穴也所在刺巨骨穴各一巨骨穴

肩端上行兩叉骨間陷者中手陽明陽脉二經之會刺

可入同身寸之一寸半若灸者可灸三壯新校正云

按甲乙經
作五壯

曲掖上骨穴各一

謂臑俞二穴也在肩臑後大骨下脾上廉陷者中手

太陽陽維蹻脉三經之會舉臂取之刺可入同身寸之八分若灸者可灸三壯
新校正云按甲乙經作手足

太陽柱骨上陷者各一

謂肩井二穴也在肩太陽陷解中缺一盆上大骨前手足少陽陽維三脉

之會刺可入同身寸之五分若灸者可灸三壯

上天窻四寸各一

謂天窻竅陰四穴也所在

刺灸分壯與氣穴同法

肩解各一

謂秉風二穴也在肩小髃骨後舉臂有空手太陽陽明手足

少陽四脉之會舉臂取之刺可入同身寸之五分若灸者可灸三壯
新校正云按甲乙經灸五壯

肩解

下三寸各一

謂天宗二穴也在秉風後大骨下陷者中手太陽脉氣所發刺可入同身寸之五分

留六呼若灸者可灸三壯

肘以下至手小指本各六俞

六俞所起於指端經言至

小指本則以端為本言上之本也下文陽明少陽同也
六俞謂小海陽谷腕骨後谿前谷少澤六穴也左右言
之則十二俞也其所在刺灸分壯氣穴同法 新校正
云後此手太陽陽明少陽三經各言至手某指本王注
以端為本者非也詳手三陽之井穴盡出手某指之端
爪甲下際此言本者是遂指爪甲之本也安得以端為
哉本

手陽明脉氣所發者二十二穴鼻空外廉項上各二

謂迎香扶突各二穴也迎香在鼻下孔傍手足陽明二
脉之會刺可入同身寸之三分扶突在曲頰下同身寸
之一寸人迎後手陽明脉氣所發仰而取之
刺可入同身寸之四分若灸者可灸三壯 大迎骨空

各一

大迎穴名也在曲頰前同身寸之一寸三分骨陷
者中動脉足陽明脉氣所發刺可入同身寸之三
分留七呼若灸者可灸三壯 新校正云詳大迎穴已
見前足陽明經中今又見於此王氏不注所以當如顙

髀穴兩出之義

柱骨之會各一

謂天鼎二穴也在頸缺盆上直扶突氣舍後同身寸之半手陽

明脉氣所發刺可入同身寸之四分若灸者可灸三壯

新校正云按甲乙經作一寸半

髃骨之會

各一

謂肩髃二穴也所在刺灸分壯與氣穴同法

新校正云按髃骨氣穴注中無刺熱注水熱穴注骨

空論注

肘以下至手大指次指本各六俞

謂三里陽谿合谷三間二

間商陽六穴也左右言之則十二俞也所在刺灸分壯與氣穴同法

新校正云按氣穴論中有曲池而無三里曲池手陽明之合也此

誤出三里而遺曲池也

手少陽脉氣所發者三十二

穴

謂顙髀二穴也所在刺灸分壯與手太陽脉同法此穴中手少陽太陽脉氣俱

會於中等無優劣故重說於此下有者同

眉後各一

謂絲竹空二穴也在眉後陷者中手少陽脉氣

所發刺可入同身寸之三分留六呼不可灸灸之不幸使人目小及盲 新校正云按甲乙經手少陽作足少

陽留六呼 角上各一 謂懸釐二穴也此與足少陽脉中作三呼 同以是二脉之會也 新校正云

按足少陽脉中言角下完骨後各一 謂天牖二穴也所下此云角上疑此誤 在刺灸分壯與氣

穴同 項中足太陽之前各一 謂風池二穴也在耳後陷法 者中按之引於耳中手足

少陽脉之會刺可入同身寸之四分若灸者可灸三壯 新校正云按甲乙經在顛顛後髮際足少陽陽維之

會刺可入俠扶突各一 謂天窓二穴也在曲頰下扶突後入三分 動脉應手陷者中手太陽脉氣所

發刺可入同身寸之六 肩貞各一 肩貞穴名也在肩曲分若灸者可灸三壯 胛下兩骨解間肩髃

後陷者中手太陽脉氣所發刺可入 肩貞下三寸分間 同身寸之八分若灸者可灸三壯

各一

謂肩髃臑會消灤各二穴也其穴各在肉分間也

刺可入同身寸之七分若灸者可灸三壯臑會在胃前廉去肩端同身寸之三寸手陽明少陽二絡氣之會刺

可入同身寸之五分灸者可灸五壯消灤在肩下臂外關掖斜肘分下行間手少陽脉之會刺可入同身寸之

五分若灸者可灸三壯

肘以下至手小指次指本各六俞

謂天井支溝陽

池中渚液門關衝六穴也左右言之則十二俞也所在刺灸分壯與氣穴同法

督脉氣所發者

二十八穴

今少一穴新校正云按會陽二穴為

項中

央二

是謂風府瘡門二穴也悉在項中餘一穴今亡風府在項上入髮際同身寸之一寸大筋內宛宛中

督脉陽維之會刺可入同身寸之四分留三呼不可妄灸灸之不幸令人瘡瘡門在項髮際宛宛中去風府同

身寸之一寸督脉陽維二經之會仰頭取之刺可入同
身寸之四分禁不可灸灸之令人瘡 新校正云按王
氏云風府瘡門悉在項中餘一穴今亡者非謂此二十
八穴中亡其一穴也王氏蓋見氣穴論大椎上兩傍各

一穴亦在項之穴也今亡故云餘一穴今亡也 **髮際後中八** 謂神庭上星顙會

間腦戶八穴也其正髮際之中也神庭在髮際直鼻督
脉足太陽陽明脉三經之會禁不可刺若刺之令人顛

疾目失睛若灸者可灸三壯上星在顙上直鼻中央入
髮際同身寸之一寸陷者中容豆顙會在上星後同身

寸之一寸陷者中前頂在顙會後同身寸之一寸五分
骨間陷者中百會在前頂後同身寸之一寸五分頂中

央旋毛中陷容指督脉足太陽之交會後頂在百會後
同身寸之一寸五分強間在後頂後同身寸之一寸五

分腦戶在強間後同身寸之一寸五分督脉足太陽之
會不可灸此八者並督脉氣所發也上星百會強間腦

戶各刺可入同身寸之三分上星留六呼腦戶留三呼
餘並刺可入同身寸之四分若灸者可灸五壯新校

正云按甲乙經腦戶不可灸面中三謂素膠水溝斷交三
灸骨空論注云不可妄灸

端督脉氣所發刺可入同身寸之三分水溝在鼻柱下
人中直脣取之督脉手陽明之會刺可入同身寸之二

分留六呼若灸者可灸三壯斷交在脣內齒上斷縫督
脉任脉二經之會可逆刺之入同身寸之三分若灸者

可灸三壯此三者正大椎以下至尻尾及傍十五穴脊
居面左右之中也

之間有大椎陶道身柱神道靈臺至陽筋縮中樞脊中
懸樞命門陽關腰俞長強會陽十五俞也大椎在第一

椎上陷者中三陽督脉之會陶道在項大椎節下間督
脉足太陽之會俛而取之身柱在第三椎節下間俛而

取之神道在第五椎節下間俛而取之靈臺在第六椎
節下間俛而取之至陽在第七椎節下間俛而取之筋

縮在第九椎節下間，俛而取之，中樞在第十椎節下間，俛而取之，脊中在第十一椎節下間，俛而取之，禁不可灸。令人僂，懸樞在第十三椎節下間，伏而取之，命門在第十四椎節下間，伏而取之，陽關在第十六椎節下間，坐而取之，腰俞在第二十一椎節下間，長強在脊骶端，督脉別絡少陰二脉所結，會陽穴在陰尾骨兩傍，凡此十五者，並督脉氣所發，腰俞長強各刺可入同身寸之二分。新校正云：按甲乙經作二寸，水穴論注作二分。腰俞穴，繆刺論注作二寸，熱穴注作二寸，刺熱注作二分。諸注不同，雖甲乙經作二寸，疑大深與其失之深，不若失之淺，宜從二分之說。留七呼，懸樞刺可入同身寸之三分，會陽刺可入同身寸之八分，餘並刺可入同身寸之五分。陶道神道各留五呼，陶道身柱神道筋縮可灸五壯，大椎可九壯，餘並可三壯。新校正云：按甲乙經無靈臺中至骶下凡二十一節脊椎法也。通項骨，樞陽關三穴。

二十
四節
任脉之氣所發者二十八穴
今少
喉中央二
謂廉

突二穴也廉泉在頷下結喉上舌本下陰維任脉之會
刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸三壯天突

在頸結喉下同身寸之四寸中央宛宛中陰維任脉之
會低鍼取之刺可入同身寸之一寸留七呼若灸者可

灸三
膺中骨陷中各一
謂璇璣華蓋紫宮玉堂膺中

寸之一寸華蓋在璇璣下同身寸之一寸紫宮玉堂膺
中中庭各相去同身寸之一寸六分陷者中並任脉氣

所發仰而取之各刺可入同身
寸之三分若灸者可灸五壯
鳩尾下三寸胃脘五寸

胃脘以下至橫骨六寸半一
新校正云詳
腹脉法也
鳩尾

心前穴名也其正當心蔽骨之端言其骨垂下如鳩鳥
尾形故以為名也鳩尾下有鳩尾巨闕上脘中脘建里

下腕水分齊中陰交腠腧丹田闕元中極曲骨十四俞也鳩尾在臆前蔽骨下同身寸之五分任脉之別不可灸刺人無蔽骨者從歧骨除下行同身寸之一寸新校正云按甲乙經云一寸半為鳩尾處也下次巨闕上

腕中腕建里下腕水分遮相去同身寸之一寸上腕則足陽明手太陽之會中腕則手太陽少陽足陽明三脉所生也齊中禁不可刺若刺之使人齊中惡瘍潰失出者死不治陰交在齊下同身寸之一寸任脉陰衝之會腠腧在齊下同身寸之一寸丹田三焦募也在齊下同身寸之二寸闕元小腸募也在齊下同身寸之三寸足三陰任脉之會也中極在闕元下一寸足三陰之會也曲骨在橫骨上中極下同身寸之一寸足厥陰之會凡此十四者並任脉氣所發建里丹田並刺可入同身寸之六分留七呼新校正云按甲乙經作五分十呼上腕陰交並刺可入同身寸之八分下腕水分並刺可入同身寸之一寸中腕腠腧並刺可入同身寸之一寸

二分曲骨刺可入同身寸之一寸半留七呼餘並刺可入同身寸之一寸二分若灸者關元中脘各可灸七壯齊中中極曲骨各三壯餘並可五壯自鳩尾下至陰間並任脉主之腹脉法也 新校正云據此注云餘並刺入一寸二分關元在中與甲乙經及氣穴骨空注刺入二寸不同當從甲乙經之寸數 下陰別一

謂會陰一穴也自曲骨下至陰陰之下兩陰之間則此穴也是任脉別絡俠督脉者衝脉之會故曰下陰別一也刺可入同身寸之二寸留七呼若灸者可灸三壯 新校正云按甲乙經七呼作留三呼 目下各

一 謂承泣二穴也在目下同身寸之七分上直瞳子陽蹻任脉足陽明三經之會刺可入同身寸之三分不

可灸 下脘 一 謂承漿穴也在頤前下脘之下足陽明脉任脉之會開口取之刺可入同身寸之二分留

五呼若灸者可灸三壯 新斷交一 斷交穴名也所在按正云按甲乙經作留六呼 刺灸分壯與脉同

法 衝脉氣所發者二十二穴俠鳩尾外各半寸至齊寸

一 謂幽門通谷陰都石關商曲育俞六穴左右則十二穴也幽門俠巨關兩傍相去各同身寸之半寸陷者

中下五穴各相去同身寸之一寸並衝脉足少陰二經之會各刺可入同身寸之一寸若灸者可灸五壯 新

校正云按此云各刺入一寸按 俠齊下傍各五分至橫甲乙經云幽門通谷刺入五分

骨寸一腹脉法也 謂中注髓府胞門陰關下極五穴左右則十穴也中注在育俞下同身寸

之五分上直幽門下四穴各相去同身寸之一寸並衝脉足少陰二經之會各刺可入同身寸之一寸若灸者

可灸 足少陰舌下厥陰毛中急脉各一 足少陰舌下二穴在人迎前陷

中動脉前是日月本左右二也足少陰脉氣所發刺可入同身寸之四分急脉在陰髦中陰上兩傍相去同身

寸之二寸半按之隱指堅然甚按則痛引上下也其左者中寒則上引少腹下引陰丸善為痛為少腹急中寒此兩脉皆厥陰之大絡通行其中故曰厥陰急脉即畢之系也可灸而不可刺病疝少腹痛即可灸 新校正云詳舌下毛中 手少陰各一 謂手少陰郄穴也在腕後之穴甲乙經無 同身寸之半寸手少陰郄也刺可入同身寸之三分若 陰陽蹻各一 陰蹻一謂交灸者可灸三壯左右二也 信穴也交信

在足內踝上同身寸之二寸少陰前太陰後筋骨間陰蹻之郄刺可入同身寸之四分留五呼若灸者可灸三壯陽蹻一謂附陽穴也附陽在足外踝上同身寸之三寸太陽前少陽後筋骨間謹取之陽蹻之郄刺可入同身寸之六分留七呼若灸者 手足諸魚際脉氣所發者凡

三百六十五穴也

經之所存者多凡一十九穴此所謂氣府也然散穴俞諸經脉部分皆有

之故經或不言而甲乙經經
脉流注多少不同者以此

黃帝內經素問卷十五

黃帝內經素問卷十五音釋

皮部論蜚

扶沸切

腠

渠殞切

氣穴論蔽

必寐切

臍

音臍

臍

奴到切

氣府論顙

音信

諛諛

上音衣

顙

上音喜

顙

下音喜

輒

下音車

𦵏

音祕

頰

音仇

黃帝內經素問卷十五音釋

欽定四庫全書薈要卷一萬四百四十二子部

黃帝內經素問卷十六

唐王冰次注

宋林億等校正

骨空論

水熱穴論

骨空論篇第六十

新校正云按全元起本在第二卷自灸寒熱之法已下在第六卷刺齊篇末

黃帝問曰余聞風者百病之始也以鍼治之柰何

始初也

岐伯對曰風從外入令人振寒汗出頭痛身重惡寒

風中

身形則腠理閉密陽氣內拒寒復外勝勝拒相薄榮衛失所故如是治在風府風府穴也

髮際同身寸之一寸宛宛中督脉足太陽之會刺可入

同身寸之四分若灸者可灸五壯新校正云按風府

注氣穴論氣府論中各已注與甲乙經同此注云督脉

足太陽之會可灸五壯者乃是風門熱府穴也當云督

脉陽維之會留三

呼不可灸乃是調其陰陽不足則補有餘則寫用鍼之道

必法天常盛寫大風頸項痛刺風府風府在上椎上椎謂大

虛補此其常也

椎上入髮際同大風汗出灸譙譙譙譙在背下俠脊傍

身寸之一寸

三寸所厭之令病者呼譙譙譙譙應手譙譙穴也在肩

椎下兩傍各同身寸之三寸以手厭之令病人呼譙譙

之聲則指下動矣足太陽脉氣所發刺可入同身寸之

六分留七呼若灸者可灸

從風憎風刺眉頭

謂攢竹穴也在眉頭

陷者中脉動應手足太陽脉氣所發刺可入同身寸之三分若灸者可灸三壯

失枕在肩上橫

骨間

謂缺盆穴也在肩上橫骨陷者中手陽明脉氣所發刺可入同身寸之二分留七呼若灸者可灸三

壯刺入深令人逆息明此云手陽明詳二經

新校正云按氣府注作足陽明此云手陽明詳二經俱發於此故王注兩言之

折

使榆臂齊肘正灸脊中

榆讀為搖搖謂搖動也然失枕非獨取肩上橫骨間乃當正形

灸脊中也欲而驗之則使搖動其臂屈折其肘自項之下橫齊肘端當其中間則其處也是曰陽關在第十六椎節下間督脉氣所發刺可入同身寸之五分若灸者可灸三壯

新校正云詳陽關穴甲乙經無

眇絡

季脇引少腹而痛脹刺譙譙

眇謂俠脊兩傍空軟處也少腹齊下也

腰痛

不可以轉搖急引陰卵刺八髎與痛上八髎在腰尻分

間

八或為九驗真骨及中誥孔穴經止有八髎無九髎也分謂腰尻筋肉分間陷下處

鼠瘻寒熱

還刺寒府寒府在附膝外解營

膝外骨間也屈伸之處寒氣喜中故名寒府也

解謂骨解營謂深刺而必中其營也

取膝上外者使之拜取足心者使之

跪

拜而取者使膝穴空開也跪而取之者令足心宛宛處深定也

任脉者起於中極之

下以上毛際循腹裏上關元至咽喉上頤循面入目

新校

正云按難經甲乙經無上頤循面入目六字

衝脉者起於氣街並少陰之經

新校正云按難經甲乙經作陽明

俠齊上行至胷中而散

任脉衝脉皆奇經也任脉

當齊中而上行衝脉俠齊兩傍而上行然中極者謂齊下同身寸之四寸也言中極之下者言中極從少腹之內上行而外出於毛際而上非謂本起於此也關元者謂齊下同身寸之三寸也氣街者穴名也在毛際兩傍鼠臕上同身寸之一寸也言衝脉起於氣街者亦從少腹之內與任脉並行而至於足是乃循腹也何以言之鍼經曰衝脉者十二經之海與少陰之絡起於腎下出於氣街又曰衝脉任脉者皆起於胞中上循脊裏為經絡之海其浮而外者循腹各行會於咽喉別而絡唇口血氣盛則皮膚熱血獨盛則滲灌皮膚生毫毛由此言之則任脉衝脉從少腹之內上行至中極之下氣街之內明矣

新校正云按氣街與氣府論刺熱篇水熱穴篇刺禁論等注重文雖不同

任脉為病男子內結七疝女處所無別備注氣府論中

子帶下瘕聚衝脉為病逆氣裏急督脉為病脊強反折

督脉亦奇經也然任脉衝脉督脉者一源而三歧也故經或謂衝脉為督脉也何以明之今甲乙及古經脉流注圖經以任脉循背者謂之督脉自少腹直上者謂之任脉亦謂之督脉是則以背腹陰陽別為名目爾以任脉自胞上過帶脉貫齊而上故男子為病內結七疝女子為病則帶下瘕聚也以衝脉俠齊而上並少陰之經上至胃中故衝脉為病則逆氣裏急也以督脉上循脊裏故督脉為病則脊強反折也

督脉者起

於少腹以下骨中央女子入繫廷孔

起非初起亦猶任脉衝脉起於胞中

也其實乃起於腎下至於少腹則下行於腰橫骨圍之中央也繫廷孔者謂窈漏近所謂前陰穴也以其陰廷繫屬於中
其孔溺孔之端也
孔則窈漏也窈漏之中其故名之
此溺孔之上端也而督脉自骨圍中央則至於是
其絡循陰器合篡間繞篡後

督脉別絡自溺孔之端分而各行下循陰器乃合篡間也所謂間者謂在前陰後陰之兩間也自兩間之後已復分而行別繞臀至少陰與巨陽中絡者合少陰上股繞篡之後

內後廉貫脊屬腎

別謂別絡分而各行之於焦也足少陰之絡者自股內後廉貫脊屬腎足

太陽絡之外行者循髀樞絡股陽而下其中行者下貫
醫至臍中與外行絡合故言至少陰與巨陽中絡合少
陰上股內後廉貫脊屬腎也
校正云詳各行於焦疑焦字誤
新
與太陽起於目內眥

上額交巔上入絡腦還出別下項循肩髃內俠脊抵腰

中入循膂絡腎

接繞髀而

其男子循莖下至篡與女子

等其少腹直上者貫膂中央上貫心入喉上頤環脣上

繫兩目之下中央

自與太陽起於目內眥下至女子等並督脉之別絡也其直行者自尻上

循脊裏而至於鼻孔也自其少腹直上至兩目之下中央並任脉之行而云是督脉所繫由此言之則任脉衝

脉督脉名異而同體也

此生病從少腹上衝心而痛不得前後為

衝疝

尋此生病正是任脉經云為衝疝者正明督脉以別主而異目也何者若一脉一氣而無陰陽之異

主則此生病者當心背俱痛豈獨衝心而為疝乎

其女子不孕瘕瘕遺溺嗌乾

亦以衝脉任脉並自少腹上至於咽喉又以督脉循陰器合篡間繞篡後別繞臑故不孕瘕瘕遺溺嗌乾也所以謂之任脉者女子得之以任養也故經云此病其女子不孕也所以謂之衝脉者以其氣上衝也故經云此生病從少腹上衝心而痛也所以謂之督脉者以其督領經脉之海也由此三用故一源三岐經或通呼似相

謬引故督脉生病治督脉治在骨上甚者在齊下營

此亦

下文曰正任脉之分也衝任督三脉異名同體亦明矣骨上謂腰橫骨上髂際中曲骨穴也任脉足厥陰之會刺可入同身寸之一寸半若灸者可灸三壯齊下謂齊直下同身寸之一寸陰交穴任脉陰衝之會刺可入同身寸之八分若灸者可灸五壯

其上氣有音者治其喉中央在缺盆中者

中謂缺盆兩間之中天突穴在頸結喉下同身寸之四寸中央宛宛中陰維任脉之會低鉞取之刺可入同身寸之一寸留七呼其病上衝喉者治其漸漸者上俠頤

若灸者可灸三壯

也

陽明之脉漸上頤而環唇故以俠頤名為漸也是謂大迎大迎在曲頤前骨同身寸之一寸三分陷中動

脉足陽明脉氣所發刺可入同身寸蹇膝伸不屈治其

之三分留七呼若灸者可灸三壯

蹇膝伸不屈治其

捷

賽膝謂膝痛屈伸蹇難也捷謂髀輔骨上橫

坐而膝

痛治其機

髌骨兩傍相接處

立而暑解治其骸關

暑熱也若膝痛立而膝骨

解中熱者治其骸關骸關謂膝解也一經云起而引解言膝痛起立痛引膝骨解之中也暑引二字其義則異

起立二字其意頗同

膝痛痛及拇指治其臑

臑謂膝解之後曲脚之中委中穴背面取

之脉動應手足太陽脉之所入刺可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸三壯

坐而膝痛如

物隱者治其關

關在臑上當捷之後背立按之以動搖筋應手

膝痛不可屈伸

治其背內

謂大杼穴也所在灸刺分壯與氣穴同法

連髀若折治陽明中俞

膠若膝痛不可屈伸連髀痛如折者則鍼陽明脉中俞膠也是則正取三里穴也

若別治巨陽

少陰榮

若痛而膝如別離者則治足太陽少陰之榮也足太陽榮通谷也在足小指外側本節前陷者

中刺可入同身寸之二分留五呼若灸者可灸三壯足少陰榮然谷也在足內踝前起大骨下陷者中刺可入

同身寸之三分留三淫灤脛痠不能久立治少陽之維

呼若灸者可灸三壯新校正云按甲乙經外踝上五寸乃在外上五寸淫灤謂似

足少陽之絡此云維者字之誤也酸痛而無力也三寸一云四寸中腧圖經外踝上四寸無穴五寸是光明穴也足少陽之絡刺可入同身寸之

七分留十呼若灸者可灸五壯新校輔骨上橫骨下正云按甲乙經云刺入六分留七呼

為捷俠髁為機膝解為骸關俠膝之骨為連骸骸下為

輔輔上為臑臑上為關頭橫骨為枕由是則謂膝輔骨上腰髁骨下為捷

捷上為機膝外為骸關捷後為關關下為胛胛下為輔
骨輔骨上為連骸連骸者是骸骨相連接處也頭上之

橫骨為枕骨

水俞五十七穴者尻上五行行五伏菟上兩行

行五左右各一行行五踝上各一行行六穴

分所在刺灸壯具水

熱穴論中此皆是骨空故氣穴篇內與此重言爾

髓空在腦後三分在顙際銳

骨之下

是謂風府通腦中也

一在斷基下

當頤下骨陷中有穴容豆中詰名下頤

一

在項後中復骨下

謂瘡門穴也在項髮際宛宛中入系舌本督脉陽維之會仰頭取之刺可

入同身寸之四分禁不可灸

一在脊骨上空在風府上

上謂腦戶穴也在枕骨上

大羽後同身寸之一寸五分宛宛中督脉足太陽之會此別腦之戶不可妄灸灸之不幸令人瘡刺可入同身

寸之三分留三呼
新校正云按甲乙經大羽者強間之別名氣府注云若灸者可灸五壯
脊骨下

空在尻骨下空

乙不應主療經闕其名

新校正云按甲乙經長強在脊骹端正

云不應主療經闕其名得非誤乎

數髓空在面俠鼻

謂顙髁等穴經一指陳其處小小

者或骨空在口下當兩肩

謂大迎穴也所在刺灸分壯與前俠頤同法

兩髀

骨空在髀中之陽

近肩髃穴經無名

臂骨空在臂陽去踝四寸

兩骨空之間

在支溝上同身寸之一寸是謂通間校正云按甲乙經支溝上一寸名三陽絡

新

通間豈其別名歟

股骨上空在股陽出上膝四寸

在陰市上伏菟穴下在承

也髀骨空在輔骨之上端

謂犢鼻穴也在膝髌下髀骨上俠解大筋中足陽明脉氣

所發刺可入同身寸之六
分若灸者可灸三壯耳

股際骨空在毛中動下

經關其名

尻骨空在髀骨之後相去四寸

是謂尻骨八髀穴也

扁骨有滲理

湊無髓孔易髓無空

扁骨謂尻間扁戾骨也其骨上有滲灌文理歸湊之無別髓孔也易

亦也骨有孔則髓有孔骨若無孔髓亦無孔也

灸寒熱之法先灸項大椎以年

為壯數

如患人之年數也

次灸掇骨以年為壯數

尾窮謂之掇骨

視背

俞陷者灸之

背胛骨際有陷處也

舉臂肩上陷者灸之

肩髃穴也在肩端兩

骨間手陽明蹻脉之會刺可入同身寸之六分留六呼若灸者可灸三壯

兩季脇之間灸之

京門穴腎募也在髀骨與腰中季脇本俠脊刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯

外踝上

絕骨之端灸之

陽輔穴也在足外踝上輔骨前絕骨之端如前同身寸之三分所去丘虛七寸

足少陽脉之所行也刺可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸三壯

新校正云按甲乙經云在外踝上四

寸 足小指次指間灸之

俠谿穴也在足小指次指歧骨間本節前陷者中足少陽脉之

所流也刺可入同身寸之三分留三呼若灸者 腓下陷

可灸三壯

新校正云按甲乙經流當作留字

新校正云按

脉灸之

承筋穴也在腓中央陷者中足太陽脉氣所發也禁不可刺若灸者可灸三壯

新校正云按

刺腰痛篇注云腓 外踝後灸之

崑崙穴也在足外踝後跟骨上陷者中細脉動

應手足太陽脉之所行也刺可入同身寸之五分留十呼若灸者可灸三壯

缺盆骨上切之

堅痛如筋者灸之

經關其名當隨其所有而灸之

膺中陷骨間灸之

天突

穴也所在灸刺分壯與前缺盆中者同法

掌束骨下灸之

陽池穴也在手表腕上陷者中手少

陽脉之所過也刺可入同身寸之二分留六呼若灸者可灸三壯

齊下關元三寸灸之

正在齊下同身寸之三寸也足三陰任脉之會刺可入同身寸之二寸留七呼若灸者可灸七壯

新校正云

按氣府注云刺可入一寸二分者非

毛際動脉灸之

以脉動應手為處即氣街穴也

膝下

三寸分間灸之

三里穴也在膝下同身寸之三寸胛骨外廉兩筋肉分間足陽明脉之所入也

刺可入同身寸之三寸留七呼若灸者可灸三壯

足陽明跗上動脉灸之

陽街

穴也在足跗上同身寸之五寸骨間動脉足陽明脉之所過也刺可入同身寸之三分留十呼若灸者可灸三

壯
新校正云按甲乙經及全元起本足陽明下育灸之二字并跗上動脉是二穴今王氏去灸之二字則是

一穴今於注中却存灸之二字以闕疑之

巔上一灸之

百會穴也在巔中央旋毛中陷容指督脉

足太陽脉之交會刺可入同身寸之三分若灸者可灸五壯

犬所嚙之處灸之三壯

即以犬傷病法灸之

犬傷而發寒熱者即以犬傷法三壯灸之

凡當灸二十

九處傷食灸之

陽食為病亦發寒熱故灸詳足陽明不別灸則有二十八處疑王

新校正云

氏去上文灸之二字者非

不已者必視其經之過於陽者數刺其俞

而藥之

水熱穴論篇第六十一

新校正云按金元起本在第八卷

黃帝問曰少陰何以主腎腎何以主水歧伯對曰腎者

至陰也至陰者盛水也肺者太陰也少陰者冬脉也故

其本在腎其末在肺皆積水也

陰者謂寒也冬月至寒腎氣合應故云腎者至

陰也水王於冬故云至陰者盛水也腎少陰脉從腎上貫肝鬲入肺中故云其本在腎其末在肺也腎氣上逆則水氣客於肺中故云皆積水也帝曰腎何以能聚水而生病歧伯曰

腎者胃之關也關門不利故聚水而從其類也

關者所以司出

入也腎主下焦膀胱為府主其分注開竅二陰故腎氣化則二陰通二陰闕則胃填滿故云腎者胃之關也關閉則水積水積則氣停氣停則水生水生水則氣溢氣水同類故云關門不利聚水而從其類也靈樞經曰下焦溢為水此上下溢於皮膚故為跗腫跗腫者聚水而生之謂也

病也

上謂肺下謂腎肺腎俱溢故聚水於腹中而生病也

帝曰諸水皆生於腎乎

岐伯曰腎者牝藏也

牝陰也亦主陰位故云牝藏

地氣上者屬於腎

而生水液也故曰至陰勇而勞甚則腎汗出腎汗出逢

於風內不得入於藏府外不得越於皮膚客於玄府行

於皮裏傳為胛腫本之於腎名曰風水

勇而勞甚謂力房也勞勇汗患

則玄府開汗出逢風則玄府復閉玄府閉已則餘汗未出內伏皮膚傳化為水從風而水故名風水

所謂

玄府者汗空也

汗液色玄從空而出以汗聚於裏故謂之玄府府聚也

帝曰水俞

五十七處者是何主也岐伯曰腎俞五十七穴積陰之

所聚也水所從出入也尻上五行行五者此腎俞

背俞

凡有五行當其中者督脉氣所發次兩傍四行皆足大陽脉氣也

故水病下為跗腫大

腹上為喘呼

水下居於腎則腹至足而跗腫上入於肺則喘息賁急而大呼也

不得卧

者標本俱病

標本者肺為標腎為本如肺腎俱水為病也

故肺為喘呼腎

為水腫肺為逆不得卧

肺為喘呼氣逆不得卧者以其主呼吸故也腎為水腫者以其

主水分為相輸俱受者水氣之所留也

分其居處以名之則是氣相輸

應本其俱受病氣則皆是水所留也

伏菟上各二行行五者此腎之街也

街謂道也腹部正俞凡有五行俠齊兩傍則腎藏足少陰脉及街脉氣所發次兩傍則胃府足陽明脉氣所發

此四行穴則伏
菟之上也

三陰之所交結於脚也踝上各一行行六

者此腎脉之下行也名曰太衝

腎脉與衝脉並下行循足合而盛大故曰太衝

凡五十七穴者皆藏之陰絡水之所客也

經所謂五十七者然尻上

五行行五則背脊當中行督脉氣所發者脊中懸樞命門腰俞長強當其處也次俠督脉兩傍足太陽脉氣所

發者有大腸俞小腸俞膀胱俞中脘內俞白環俞當其處也又次外俠兩傍足太陽脉氣所發者有胃倉育門

志室胞育秩邊當其處也伏菟上各二行行五者腹部正俞俠中行任脉兩傍衝脉足少陰之會者有中注四

滿氣穴大赫橫骨當其處也次俠衝脉足少陰兩傍足陽明脉氣所發者有外陵大巨水道歸來氣街當其處

也踝上各一行行六者足內踝之上有足少陰陰踞脉並循腓上行足少陰脉有太衝復溜陰谷三穴陰踞脉

有照海交信築賓三穴陰蹻既足少陰脉之別亦可通而主之兼此數之猶少一穴脊中在第十一椎節下間俛而取之刺可入同身寸之五分不可灸令人僂懸樞在第十三椎節下間伏而取之刺可入同身寸之三寸若灸者可灸三壯命門在第十四椎節下間伏而取之刺可入同身寸之五分若灸者可灸三壯腰俞在第二十一椎節下間刺可入同身寸之二分新校正云按甲乙經及繆刺論注并熱穴注俱云刺入二寸而刺熱注氣府注并此注作二分宜從二分之說留七呼若灸者可灸三壯長強在脊骶端督脉別絡少陰所結刺可入同身寸之二分留七呼若灸者可灸三壯此五穴者並督脉氣所發也新校正云詳王氏云少一穴按氣府論注十二椎節下有陽關一穴若通數陽關則不少矣次俠督脉兩傍大腸俞在第十六椎下俠督脉兩傍去督脉各同身寸之一寸半刺可入同身寸之三寸留六呼若灸者可灸三壯小腸俞在第十八椎下兩

傍相去及刺灸分壯法如大腸俞膀胱俞在第十九椎下兩傍相去及刺灸分壯法如大腸俞中脘內俞在第二十椎下兩傍相去及刺灸分壯法如大腸俞俠脊脇肺起肉留十呼白環俞在第二十一椎下兩傍相去如大腸俞伏而取之刺可入同身寸之五分若灸者可灸三壯肓門在第十三椎下兩傍相去及刺灸分壯法如胃倉志室在第十四椎下兩傍相去及刺灸分壯法如胃倉正坐取之胞育在第十九椎下兩傍相去及刺灸分壯法如胃倉伏而取之秩邊在第二十一椎下兩傍相去及刺灸分壯法如胃倉伏而取之秩邊在第二十一椎下兩傍相去及刺灸分壯法如胃倉去任脉各同身寸之五分新校正云按甲乙經同氣

府注云俠中行方一寸文異而義同 四滿在中注下
同身寸之一寸氣穴在四滿下同身寸之一寸大赫在
氣穴下同身寸之一寸橫骨在大赫下同身寸之一寸
各橫相去同身寸之一寸並衝脉足少陰之會刺可入
同身寸之一寸若灸者可灸五壯次外兩傍穴外陵在
齊下同身寸之一寸 新校正云按氣府論注云外陵在
在天樞下一寸與此正同 兩傍去衝脉各同身寸之
一寸半大巨在外陵下同身寸之一寸水道在大巨下
同身寸之三寸歸來在水道下同身寸之三寸氣街在
歸來下 新校正云按氣府注刺熱注熱穴注云在腹
齊下橫骨兩端鼠臑上一寸刺禁注云在腹下俠齊兩
傍相去四寸鼠僕上一寸動脉應手骨空注云在毛際
兩傍鼠臑下諸注不同今備錄之 鼠臑上同身寸之
一寸各橫相去同身寸之二寸此五穴者並足陽明脉
氣所發水道刺可入同身寸之二寸半若灸者可灸五
壯氣街刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三

壯餘三穴並刺可入同身寸之八分若灸者並可五壯
所謂腎之街者則此也踝上各一行行六者太鍾在足
內踝後街中新校正云按甲乙經云跟後衝中刺瘡
注刺腰痛注作跟後街中動脈此云內踝後此注非

足少陰絡別走太陽者刺可入同身寸之二分留三呼
若灸者可灸三壯復溜在內踝上同身寸之二寸陷者
中足少陰脈之所行也刺可入同身寸之三分留三呼
若灸者可灸五壯照海在內踝下刺可入同身寸之四
分留六呼若灸者可灸三壯交信在內踝上同身寸之
二寸少陰前太陰後筋骨間陰蹻之郄刺可入同身寸
之四分留五呼若灸者可灸三壯築賓在內踝上臑分
中陰維之郄刺可入同身寸之三分若灸者可灸五壯
陰谷在膝下內輔骨之後大筋之下小筋之上按之應
手屈膝而得之足少陰脈之所入也刺可入同身寸之
四分若灸者可灸三壯所謂腎
帝曰春取絡脉分肉何
脉之下行名曰太衝者則此也

也岐伯曰春者木始治肝氣始生肝氣急其風疾經脉

常深其氣少不能深入故取絡脉分肉間帝曰夏取盛

經分腠何也岐伯曰夏者火始治心氣始長脉瘦氣弱

陽氣留溢

新校正云按別本留一作流

熱熏分腠內至於經故取盛

經分腠絕膚而病去者邪居淺也

絕謂絕破令病得出也

所謂盛

經者陽脉也帝曰秋取經俞何也岐伯曰秋者金始治

肺將收殺

三陰已升故漸將收殺

金將勝火陽氣在合

金王火衰故云金將

勝火陰氣初勝濕氣及體

以漸於雨濕霧露故云濕氣及體

陰氣未盛未

能深入故取俞以寫陰邪取合以虛陽邪陽氣始衰故

取於合

新校正云按皇甫士安云是謂始秋之治變

帝曰冬取井榮何也岐

伯曰冬者水始治腎方閉陽氣衰少陰氣堅盛巨陽伏

沈陽脉乃去

去謂下去

故取井以下陰逆取榮以實陽氣

新校

正云按全元起本實作遣甲乙經千金方作通

故曰冬取井榮春不取

新校

按皇甫士安云是謂末冬之治變

此之謂也

新校正云按此與四時刺逆從論及診要經終論義

頗不同與九卷之義相通

帝曰夫子言治熱病五十九俞余論其意

未能領別其處願聞其處因聞其意岐伯曰頭上五行

行五者以越諸陽之熱逆也

星頭上五行者當中行謂上

兩傍謂五處承光通天絡却玉枕又次兩傍謂臨泣目

窻正營承靈腦空也上星在顙上直鼻中央入髮際同

身寸之一寸陷者中容豆刺可入同身寸之三分顙會

在上星後同身寸之一寸陷者中刺可入同身寸之四

分前頂在顙會後同身寸之一寸五分骨間陷者中刺

如顙會法百會在前頂後同身寸之一寸五分頂中央

旋毛中陷容指督脉足太陽脉之交會刺如上星法後

頂在百會後同身寸之二寸五分枕骨上刺如顙會法

然是五者皆督脉氣所發也上星留六呼若灸者並可

灸五壯次兩傍穴五處在上星兩傍同身寸之一寸五

分承光在五處後同身寸之一寸通天在承光後同身

寸之一寸五分絡却在通天後同身寸之一寸五分玉

枕在絡却後同身寸之七分然是五者並足太陽脉氣

所發刺可入同身寸之三分五處通天各留七呼絡却

留五呼王枕留三呼若灸者可灸三壯
新校正云按甲乙經承光不灸王枕刺入二分
又次兩傍臨泣在頭

直目上入髮際同身寸之五分足太陽少陽陽維三脉
之會目窻正營遞相去同身寸之一寸承靈腦空遞相

去同身寸之一寸五分然是五者並足少陽陽維二脉
之會腦空一穴刺可入同身寸之四分餘並可刺入同

身寸之三分臨泣留七
大杼膺俞缺盆背俞此八者以

寫胃中之熱也
大杼在項第一椎下兩傍相去各同身

陽三脉氣之會刺可入同身寸之三
分留七呼若灸者可灸五壯
新校正云按甲乙經并氣穴注作七壯刺

瘡注刺熱注作五壯
膺俞者膺中之俞也正名中府
在胃中行兩傍相去同身寸之六寸雲門下一寸乳上

三肋間動脉應手陷者中仰而取之手足太陰脉之會
刺可入同身寸之三分留五呼若灸者可灸五壯缺盆

在肩上橫骨陷者中手陽明脉氣所發刺可入同身寸
之二分留七呼若灸者可灸三壯背俞即風門熱府俞
也在第二椎下兩傍各同身寸之一寸三分督脉足太
陽之會刺可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸五
壯今中腧孔穴圖經雖不名之既曰風門熱府即治熱
之背俞也 新校正云按王氏注刺熱論云背俞未詳
何處注此指名風門熱府注氣穴論以大
杼為背俞三經不同者蓋亦疑之者也 氣街三里巨

虛上下廉此八者以寫胃中之熱也

氣街在腹齊下橫
骨兩端鼠臑上同

身寸之一寸動脉應手足陽明脉氣所發刺可入同身
寸之三分留七呼若灸者可灸三壯 新校正云按氣
街諸注不同具前水穴注中 三里在膝下同身寸之
三寸肱外廉兩筋肉分間足陽明脉之所入也刺可入
同身寸之一寸留七呼若灸者可灸三壯巨虛上廉足
陽明與大腸合在三里下同身寸之三寸足陽明脉氣

所發刺可入同身寸之八分若灸者可灸三壯巨虛下廉足陽明與小腸合在上廉下同身寸之三寸足陽明脉氣所發刺可入同身寸之三壯也雲門髃骨委中髓空此八者三分若灸者可灸三壯也

以寫四支之熱也

雲門在巨骨下胷中行兩傍相去同身寸之六寸動脉應手足太陰脉氣

所發

新校正云

按甲乙經同氣穴注作手太陰刺熱注亦作手太陰舉臂取之刺可入同身寸之七分若

灸者可灸五壯驗今中誥孔穴圖經無髃骨穴有肩髃穴穴在肩端兩骨間手陽明躡脉之會刺可入同身寸

之六分留六呼若灸者可灸三壯委中在足膝後屈處臑中央約文中動脉足太陽脉之所入也刺可入同身

寸之五分留七呼若灸者可灸三壯按今中誥孔穴圖經云腰俞穴一名髓空在脊中第二十一椎節下主汗

不出足清不仁督脉氣所發也刺可入同身寸之二寸留七呼若灸者可灸三壯新校正云詳腰俞刺入二

寸當作二分已具前水穴注中**五藏俞傍五此十者以寫五藏之熱也**

俞傍五者謂魄戶神堂魂門意舍志室五穴俠脊兩傍各相去同身寸之三寸並足太陽脉氣所發也魄戶在第三椎下兩傍正坐取之刺可入同身寸之五分若灸者可灸五壯神堂在第五椎下兩傍刺可入同身寸之三分若灸者可灸五壯魂門在第九椎下兩傍正坐取之刺可入同身寸之五分若灸者可灸三壯意舍在第十一椎下兩傍正坐取之刺可入同身寸之五分若灸者可灸三壯志室在第十四椎下兩傍正坐取之刺可入同身寸之五分若灸者可灸五壯也

凡此五十九穴者皆熱之左右也

帝曰人傷於寒而傳為熱何也岐伯曰夫寒盛則生熱

也寒氣外凝陽氣內鬱腠理堅緻玄府閉封緻則氣不宣通封則濕氣內結中外相薄寒盛熱生故人傷於

寒轉而為熱汗之而愈則外凝內
鬱之理可知斯乃新病數日者也

黃帝內經素問卷十六

黃帝內經素問卷十六音釋

骨空論膊

音博

捷

音健

嚙

若結切

水熱穴論菟

音兔

閔

音祕

溜

力救

切

鼙

音奚

綴

馳二切

黃帝內經素問卷十六音釋

欽定四庫全書薈要卷一萬四百四十三

子部

黃帝內經素問卷十七

唐王冰次注

宋林億等校正

調經論篇第六十二

新校正云按全元起本在第一卷

黃帝問曰余聞刺法言有餘寫之不足補之何謂有餘何謂不足岐伯對曰有餘有五不足亦有五帝欲何問帝曰願盡聞之岐伯曰神有餘有不足氣有餘有不足

血有餘有不足形有餘有不足志有餘有不足凡此十

者其氣不等也

神屬心氣屬肺血屬肝形屬脾志屬腎以各有所宗故不等也

帝曰人

有精氣津液四支九竅五藏十六部三百六十五節乃

生百病百病之生皆有虛實今夫子乃言有餘有五不

足亦有五何以生之乎

鍼經曰兩神相薄合而成形常先身生是謂精上焦開發宣五

穀味熏膚充身澤毛若霧露之溉是謂氣腠理發泄汗出湊理是謂津津之滲於空竅留而不行者為液也十

六部者謂手足二九竅九五藏五合為十六部也三百六十五節者非謂骨節是神氣出入之處也鍼經曰所

謂節之交三百六十五會皆神氣出入遊行之所非骨節也言人身所有則多所舉則少病生之數何以論之

岐伯曰皆生於五藏也

謂五神藏也

夫心藏神肺藏氣肝藏

血脾藏肉腎藏志而此成形

言所以病皆生於五藏者何哉以內藏五神而成形

也

志意通內連骨髓而成身形五藏

志意者通言五神之大凡也骨髓者

通言表裏之成化也言五神通泰骨髓化成身形既立乃五藏互相為有矣

新校正云按甲乙經無五藏二字

五藏之道皆出於經隧以行血氣血氣不和百病乃

變化而生是故守經隧焉

經隧潛道也經脈伏行而不見故謂之經隧焉血氣者人之

神邪侵之則血氣不正血氣不正故變化而百病乃生矣然經脈者所以決死生處百病調虛實故守經隧焉

新校正云按甲乙經經隧作經渠義各通

帝曰神有餘不足何如岐伯曰

神有餘則笑不休神不足則悲

心之藏也鐵經曰心藏脉脉舍神心氣虛則悲

實則笑不休也悲一為憂誤也

新校正云詳王注云

悲一為憂誤也按甲乙經及太素并全元起注本並作

憂皇甫士安云心虛則悲悲則憂心實則笑笑則喜夫

心之與肺脾之與心互相成也故喜發於心而成於肺

思發於脾而成於心一過其節則二藏俱傷楊上善云

脾之憂在心變動也肺之憂在肺之志是則肺主秋憂

為正也心主於夏變而生憂也

血氣未并五藏安定邪客於形洒淅起

於毫毛未入於經絡也故命曰神之微

并謂并合也未與邪合故曰未

并也洒淅寒貌也始起於毫毛尚在於小絡神之微病

故命曰神之微也新校正云按甲乙經洒淅作悽厥

太素作洩洩楊上善云洩毛孔也水逆流

曰洩謂邪氣入於腠理如水逆流於洩

帝曰補寫柰

何歧伯曰神有餘則寫其小絡之血出血勿之深斥無

中其大經神氣乃平

邪入小絡故可寫其小絡之脉出其血勿深推鍼鍼深則傷肉也以

邪居小絡故不欲令鍼中大經也絡血既出神氣自平斥推也小絡孫絡也鍼經曰經脉為裏支而橫者為絡

絡之別者為孫絡平謂平調也 新校正云詳此注引
鍼經曰與三部九候論注兩引之在彼云靈樞而此曰

鍼經則王氏之意指靈樞為鍼經也按今素問注中引鍼經者多靈樞之文但以靈樞今不全故未得盡知也

神不足者視其虛絡按而致之刺而利之無出其血無

泄其氣以通其經神氣乃平

但通經脉令其和利抑按虛絡令其氣致以神不足

故不欲出血及泄氣也

新校

帝曰刺微柰何

起於毫

毛未入於經絡者

岐伯曰按摩勿釋著鍼勿斥移氣於不足神

氣乃得復

按摩其病處手不釋散著鍼於病處亦不推之使其人神氣內朝於鍼移其人神氣令自

充足則微病自去神氣乃得復常新校正云按甲乙經及太素云移氣於足無不字楊上善云按摩使氣至

於踵也

帝曰善氣有餘不足奈何岐伯曰氣有餘則喘欬上

氣不足則息利少氣

肺之藏也肺藏氣息不利則喘鍼經曰肺氣虛則鼻息利少氣實則

喘喝胃憑仰息也

血氣未并五藏安定皮膚微病命曰白氣微

泄

肺合脾其色白故皮膚微病命曰白氣微泄

帝曰補寫奈何岐伯曰氣有

餘則寫其經隧無傷其經無出其血無泄其氣不足則

補其經隧無出其氣

氣謂榮氣也。鍼寫若傷其經則血出而榮氣泄脫故不欲出血泄氣

但寫其衛氣而已。不欲泄之。

新校正云按楊上善云經隧者手太陰之

別從手太陰走手陽明乃是手太陰向手陽明之道欲道藏府陰陽故補寫皆從正經別走之絡寫其陰經別

走之路不得傷其正經也。

帝曰刺微柰何

覆前白氣微泄者

歧伯曰按摩勿

釋出鍼視之曰我將深之適人必革精氣自伏邪氣散

亂無所休息氣泄腠理真氣乃相得

亦謂按摩其病處也。革皮也。我將深

之適人必革者謂其深而淺刺之也。如是脇從則人懷懼色故精氣潛伏也。以其調適於皮精氣潛伏邪無所據故亂散而無所休息發泄於腠理也。邪氣既泄真氣乃與皮腠相得矣。新校正云按楊上善云革改也。夫

人聞樂至則身心忻悅聞痛及體情必改異忻悅則百體俱縱改革則情志必拒拒則邪氣消伏

帝曰

善血有餘不足奈何岐伯曰血有餘則怒不足則恐

肝之

藏也鐵經曰肝藏血肝氣虛則恐實則怒正云按全元起本恐作悲甲乙經及太素並同

新校

血氣

未并五藏安定孫絡水溢則經有留血

絡有邪盛則入於經故云孫絡

水溢則經有留血

帝曰補寫奈何岐伯曰血有餘則寫其盛經

出其血不足則視其虛經內鍼其脉中久留而視

新校正云

按甲乙經云久留之血至太素同

脉大疾出其鍼無令血泄

脉盛滿則血有餘故

出之經氣虛則血不足故無令血泄也久留疾出是謂補之鍼解論曰徐而疾則實義與此同

帝曰刺

留血柰何岐伯曰視其血絡刺出其血無令惡血得入

於經以成其疾

血絡滿者刺按出之則惡色之血不得入於經脉

帝曰善形有

餘不足柰何岐伯曰形有餘則腹脹溼漉不利不足則

四支不用

脾之藏也鍼經曰脾氣虛則四支不用五藏不安實則腹脹溼漉不利溼大便秘小便便也

云

新校正云按楊上善淫作經婦人月經也

血氣未并五藏安定肌肉蠕動

命曰微風

邪薄肉分衛氣不通陽氣內鼓故肉蠕動新校正云按全元起本及甲乙經蠕作溢太

素作濡

帝曰補寫柰何岐伯曰形有餘則寫其陽經不足

則補其陽絡

並胃之經絡

帝曰刺微柰何岐伯曰取分肉間

無中其經無傷其絡衛氣得復邪氣乃索

衛氣者所以溫分肉而充

皮膚肥腠理而同開闔故肉蠕動即取分肉間但開肉分以出其邪故無中其經無傷其絡衛氣復舊而邪氣

盡索散盡也

帝曰善志有餘不足柰何歧伯曰志有餘則腹

脹飧泄不足則厥

腎之藏也鉞經曰腎藏精精含志腎氣虛則厥實則脹脹謂脹起厥謂逆

行上衝也足少陰脉下行令氣不足故隨衝脉逆行而上衝也

血氣未并五藏安定骨

節有動

腎合骨故骨有邪薄則骨節鼓動或骨節之中如有物鼓動之也

帝曰補寫柰

何歧伯曰志有餘則寫然筋血者

新校正云按甲乙經及太素云寫然筋血

者出其血楊上善云然筋當是然谷下筋再詳諸處引然谷者多云然骨之前血者疑少骨之二字前字誤作

筋不足則補其復溜

然謂然谷足少陰榮也在內踝之前大骨之下陷者中血絡盛則泄

之其刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸三壯復溜足少陰經也在內踝上同身寸之二寸陷者中刺

可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸五壯帝曰刺未并柰何岐伯曰即取

之無中其經邪所乃能立虛

不求穴俞而直取居邪之處故云即取之新校正

云按甲乙經邪所作以去其邪

帝曰善余已聞虛實之形不知其何以

生岐伯曰氣血以并陰陽相傾氣亂於衛血逆於經血

氣離居一實一虛

衛行脉外故氣亂於衛血行經內故血逆於經血氣不和故一虛一實

血并於陰氣并於陽故為驚狂

氣并於陽則陽氣外盛故為驚狂

血并

於陽氣并於陰乃為炁中

氣并於陰則陽氣內盛故為熱中炁熱也

血并於

上氣并於下心煩惋善怒血并於下氣并於上亂而喜

忘

上謂兩上
下謂兩下

帝曰血并於陰氣并於陽如是血氣離居

何者為實何者為虛岐伯曰血氣者喜溫而惡寒寒則

泣不能流溫則消而去之

泣謂如雪在水中凝住而不行去也

是故氣之

所并為血虛血之所并為氣虛

氣并於血則血少故血虛血并于氣則氣少故

氣帝曰人之所有者血與氣耳今夫子乃言血并為虛

氣并為虛是無實乎岐伯曰有者為實無者為虛

氣并
于血

則血无血并
於氣則氣无

故氣并則無血血并則無氣今血與氣相

失故為虛焉

氣并于血則血失其氣血并于氣則氣失其血故曰血與氣相失

絡之與

孫脉俱輸於經血與氣并則為實焉血之與氣并走於上則為大厥厥則暴死氣復反則生不反則死帝曰實者何道從來虛者何道從去虛實之要願聞其故岐伯曰夫陰與陽皆有俞會陽注於陰陰滿之外陰陽勻平以充其形九候若一命曰平人

平人謂平和之人

夫邪之生也

或生於陰或生於陽其生於陽者得之風雨寒暑其生

於陰者得之飲食居處陰陽喜怒帝曰風雨之傷人柰

何岐伯曰風雨之傷人也先客於皮膚傳入於孫脉孫

脉滿則傳入於絡脉絡脉滿則輸於大經脉血氣與邪

并客於分腠之間其脉堅大故曰實實者外堅充滿不

可按之按之則痛帝曰寒濕之傷人柰何岐伯曰寒濕

之中人也皮膚不收

新校正云按全元起云不收不仁也甲乙經及太素云皮膚收無不

字肌肉堅緊榮血泣衛氣去故曰虛虛者聶辟氣不足

按之則氣足以溫之故快然而不痛

聶謂聶皺辟謂辟疊也新校正云

按甲乙經作攝辟太素作攝辟

帝曰善陰之生實柰何

實謂邪氣盛也

岐伯曰

喜怒不節則陰氣上逆上逆則下虛下虛則陽氣走之

故曰實矣

新校正云按經云喜怒不節則陰氣上逆疑刺喜字

帝曰陰之生虛柰

何

虛謂精氣奪也

岐伯曰喜則氣下悲則氣消消則脉虛空因

寒飲食寒氣熏滿

新校正云按甲乙經作動藏

則血泣氣去故曰虛

矣帝曰經言陽虛則外寒陰虛則內熱陽盛則外熱陰

盛則內寒余已聞之矣不知其所由然也

經言謂上古經言也

岐

伯曰陽受氣於上焦以溫皮膚分肉之間令寒氣在外

則上焦不通上焦不通則寒氣獨留於外故寒慄

慄謂振慄

也帝曰陰虛生內熱奈何岐伯曰有所勞倦形氣衰少

穀氣不盛上焦不行下脘不通

新校正云按甲乙經作下焦不通

胃氣

熱熱氣熏胃中故內熱

甚用其力致勞倦也貧役不食故穀氣不盛也

帝曰陽

盛生外熱奈何岐伯曰上焦不通利則皮膚緻密腠理

閉塞玄府不通

新校正云按甲乙經及太素无玄府二字

衛氣不得泄越故

外熱

外傷寒毒內薄諸陽寒外盛則皮膚收皮膚收則腠理密故衛氣稽聚无所流行矣寒氣外薄陽氣

內爭積火內燔故生外熱也

帝曰陰盛生內寒奈何岐伯曰厥氣上

逆寒氣積於胃中而不寫不寫則溫氣去寒獨留則血

凝泣凝則脉不通

新校正云按甲乙經作腠理不通

其脉盛大以濇故

中寒

溫氣謂陽氣也陰逆內滿則陽氣去于皮外也

帝曰陰與陽并血氣以并

病形以成刺之柰何歧伯曰刺此者取之經隧取血於

營取氣於衛用形哉因四時多少高下

營主血陰氣也衛主氣陽氣也

夫行鍼之道必先知形之長短骨之廣狹循三備法通計身形以施分寸故曰用形也四時多少高下具在下

篇

帝曰血氣以并病形以成陰陽相傾補寫柰何歧伯

曰寫實者氣盛乃內鍼鍼與氣俱內以開其門如利其

戶鍼與氣俱出精氣不傷邪氣乃下外門不閉以出其

疾搖大其道如利其路是謂大寫必切而出大氣乃屈

言欲開其穴而泄其氣也切謂急也言急出其鍼也鍼解論曰疾而徐則虛者疾出鍼而徐按之也大氣謂大

邪氣也屈謂退屈也帝曰補虛柰何岐伯曰持鍼勿置以定其意

候呼內鍼氣出鍼入鍼空四塞精無從去方實而疾出

鍼氣入鍼出熱不得還閉塞其門邪氣布散精氣乃得

存動氣候時新校正云按甲乙經作動無後時近氣不失遠氣乃來是

謂追之言但密閉穴俞勿令其氣散泄也近氣謂已至之氣遠氣謂未至之氣也欲動經氣而為補補

者皆必候水刺氣之所在而刺之是謂得時而調之
追言補也鍼經曰追而濟之安得無實則此謂也 帝

曰夫子言虛實者有十生於五藏五藏五脉耳夫十二

經脉皆生其病

新校正云按甲乙經云皆生百病太素同

今夫子獨言五藏

夫十二經脉者皆絡三百六十五節節有病必被經脉

經脉之病皆有虛實何以合之岐伯曰五藏者故得六

府與為表裏經絡支節各生虛實其病所居隨而調之

從其左右經氣支節而調之

病在脉調之血

脉者血之府脉實血實脉虛血虛由此脉病而

調之血也

新校正云按全元起本及甲乙經云病在血調之脉

病在血調之絡

血病則絡

脉易故調之於絡也

病在氣調之衛

衛主氣故氣病而調之衛也

病在肉調之

分肉

候寒熱而取之

病在筋調之筋

適緩急而刺熨之

病在骨調之骨

察輕重而調之

燔鍼劫刺其下及與急者

調筋法也筋急則燒鍼而劫刺之

病

在骨燔鍼藥熨

調骨法也燔鍼火鍼也

病不知所痛兩蹻為上

兩蹻

謂陰陽蹻脉陰蹻之脉出於照海陽蹻之脉出於申脉申脉在足外踝下陷者中容爪甲新校正云按刺腰

痛注云在踝下五分刺可入同身寸之三分留六呼若灸者可灸三壯照海在足內踝下刺可入同身寸之

四分留六呼若灸者可灸三壯

身形有痛九候莫病則繆刺之

莫病謂無病也

繆刺者刺絡脉左痛刺右右痛刺左

痛在於左而右脉病者巨刺之

巨刺者刺

經脉脉左痛刺
右古痛刺左

必謹察其九候鍼道備矣

黃帝內經素問卷十七

黃帝內經素問卷十七音釋

調經論隧

音殄

孫燔

音煩

黃帝內經素問卷十七音釋

謹案卷十五第一頁後七行陽主外陰主內按吳
崐本此六字移在上文諸經皆然之上

第四頁前二行此皆常色謂之無病按吳崐本此
八字移在上文寒多則凝泣之上

第六頁後四行刺可入同身寸之四分按刺瘡論
注四分作三分

第十頁前七行崑崙在足外踝後跟骨上刊本跟
訛跟據刺腰痛論注改

第十二頁前七行刺可入同身寸之三分刊本闕
三字據刺熱論注補

第十三頁後三行橫去任脉各同身寸之六寸刊
本闕去字據刺熱論注補

第十七頁前八行盲門志室胞育刊本兩育字並
訛作育據後文及水熱穴論注改

第十八頁前五行相去及刺如肺俞法刊本脫刺
字據下文增

第十九頁後五行刺禁注刊本注訛詳今改

第二十一頁前四行刺可入同身寸之三分刊本
脫可字據前後文增

第二十一頁後七行後八行又有氣戶庫房屋翳
刊本庫訛軍翳訛一據張志聰本引此注及下
文改

第二十三頁前一行留七呼刊本呼訛若據前後
文改

第二十五頁前五行按氣穴論中刊本論中訛作
俞也今改

第二十六頁後三行故云餘一穴今亡也刊本缺
一字據上文補

第二十九頁後二行育俞刊本育訛腎又俠巨闕
兩傍刊本闕訛關並據李時珍奇經八脉考改
卷十六第四頁前四行循髀樞刊本髀訛滑據靈

樞經改

第七頁後五行如患人之年數也刊本年數作午
以據吳崐本引此注改

第八頁後六行刺可入同身寸之三寸刊本三字
脫據氣穴論注增又足陽明跗上動脉灸之刊
本足上行一字據張志聰及吳崐本刪

第九頁後五行腎者胃之關也刊本關訛開據張
志聰高世栻吳崐三家本改

第十二頁前五行相去及刺灸分壯法如胃倉按

此則是灸三壯也甲乙經及氣府論注俱作灸

三十壯

第十三頁前八行所謂腎脉之下行刊本脉訛經
據經文改

第十四頁後六行上星留六呼刊本星訛骨據上
文改

第十五頁後八行在三里下同身寸之三寸按氣
穴論注云在犢鼻下同身寸之六寸蓋上廉在

三里下三寸三里又在犢鼻下三寸故彼此互異


卷十七第三頁後四行氣有餘不足奈何刊本脫氣字據張志聰及吳崐本增

第九頁前二行凝則脉不通按吳崐本凝字下有泣字

第十頁前六行經絡支節按張志聰本絡作脉

第十頁後三行燔鍼劫刺其下按吳崐本此句上

有病在筋三字



總校官候補中書臣吳經湯

校對官檢討臣王鍾健

謄錄監生臣趙之璧

欽定四庫全書薈要

子部

內經素問卷十八

九

詳校官主事_臣陳本




欽定四庫全書會要卷一萬四百四十

子部

黃帝內經素問卷十八

唐王冰次注

宋林億等校正


繆刺論

四時刺逆從論

標本病傳論

繆刺論篇第六十三

新校正云按全元起本在第二卷

黃帝問曰余聞繆刺未得其意何謂繆刺

繆刺言所刺之穴應用如

紀繆綱

岐伯對曰夫邪之客於形也必先舍於皮毛留

而不去入舍於孫脉留而不去入舍於絡脉留而不去

入舍於經脉內連五藏散於腸胃陰陽俱感五藏乃傷

此邪之從皮毛而入極於五藏之次也如此則治其經

焉今邪客於皮毛入舍於孫絡留而不去閉塞不通不

得入於經流溢於大絡而生奇病也

病在血絡是謂奇邪
新校正云按

全元起云大絡十五絡也

夫邪客大絡者左注右右注左上下左右

與經相干而布於四末其氣無常處不入於經俞命曰

繆刺

四末謂四支也

帝曰願聞繆刺以左取右以右取左柰何

其與巨刺何以別之歧伯曰邪客於經左盛則右病右

盛則左病亦有移易者

新校正云按甲乙經作病易且移

左痛未已而

右脉先病如此者必巨刺之必中其經非絡脉也

先病者謂

彼痛未止而此先病以承之

故絡病者其痛與經脉繆處故命曰繆

刺

絡謂正經也

正經之傍支非正別也亦兼公孫飛揚等之別新校正云按王氏云非正別也按本論邪客

足太陰絡令人腰痛注引從髀合陽明上絡噬貫舌中乃太陰之正也亦是兼脉之正安得謂之作正別也

帝曰願聞繆刺柰何取之何如歧伯曰邪客於足少陰

之絡令人卒心痛暴脹胃脇支滿

以其絡支別者並正經從腎上貫肝鬲走

於心包故邪客之則病如是

無積者刺然骨之前出血如食頃而已

然骨之前然谷穴也在足內踝前起大骨下陷者中足少陰榮也刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸

三壯刺此多見血令人立飢欲食

不已左取右右取左

言痛在左取之右痛在右取之

左餘如此例

病新發者取五日已

素有此病而新發先刺之五日乃盡已

邪客

於手少陽之絡令人喉痺舌卷口乾心煩臂外廉痛手

不及頭

以其脈循手表出臂外上肩入缺盆布臚中散絡心包其支者從臚中上出缺盆上項又心主

其舌故病如是

刺手中指次指爪甲上去端如韭葉各一痛

謂關

衝穴少陽之井也刺可入同身寸之一分留三呼若灸者可灸三壯左右手皆刺之故言各一痛痛瘡也新校正云按甲乙經關衝穴出手小指次指之端今言中指者誤也壯者立已老者有頃

已左取右右取左此新病數日已邪客於足厥陰之絡

令人卒疝暴痛

以其絡去內踝上同身寸之五寸別走少陽其支別者循脛上臑結於莖故令

人卒疝暴痛

刺足大指爪甲上與肉交者各一痛

謂大

足大指之端去爪甲角如韭葉厥陰之井也刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯

男子立

已女子有頃已左取右右取左邪客於足太陽之絡令

人頭項肩痛

以其經之正者從腦出別下項支別者從髀內左右別下又其絡自足上行循背上

頭故頭項肩痛也

新校正云按甲乙經云其支者從巔入絡腦還出別下項王氏云經之正者正當作支

刺足小指爪甲上與肉交者各一痛立已

謂至陰穴太陽之井也刺

可入同身寸之一分留五呼若灸者可灸三壯

正云按甲乙經云在足小指外側去爪甲角如韭葉

不已刺外踝下三痛左取右右取左如食頃已

謂金門穴足太

陽郄也在外踝下刺可入同身寸之三分若灸者可灸三壯

邪客於手陽明之絡令

人氣滿胃中喘息而支肘臂中熱

以其經自肩端入缺盆絡脉其支別者從

缺盆中直而上頸故病如是

刺手大指次指爪甲上去端如韭葉各

一痛左取右右取左如食頃已

謂商陽穴手陽明之井也刺可入同身寸之一

分留一呼若灸者可灸一壯
新校正云按甲乙經云商陽在手大指次指內側去爪甲角如韭葉
邪客

於臂掌之間不可得屈刺其踝後

新校正云按全元起云是人之本節踝

也
先以指按之痛乃刺之以月死生為數月生一日一

痛二日二痛十五日十五痛十六日十四痛

隨日數也月半已前

謂之生月半以後謂之死虧滿而異也

邪客於足陽蹻之脉令人目痛從

內眥始

以其脉起於足上行至頭而屬目內眥故病令

陽蹻脉者起於跟中循外踝上行入風池鍼經曰陰蹻脉入軌屬目內眥合於太陽陽蹻而上行尋此則至於

目內眥也
刺外踝之下半寸所各二痛

謂申脉穴陽蹻之所生也在外踝下陷者

中容爪甲刺可入同身寸之三分留六呼若灸者可灸三壯
新校正云詳刺腰痛注云外踝下五分左

刺右右刺左如行十里頃而已人有所墮墜惡血留內

腹中滿脹不得前後先飲利藥此上傷厥陰之脉下傷

少陰之絡刺足內踝之下然骨之前血脉出血

此少陰之絡也

新校正云詳血脉出血脉字疑是絡字刺足跗上動脉

謂衝陽穴胃之原也刺可入同身寸

之三分留十呼若灸者可灸三壯主

腹大不嗜食以腹脹滿故爾取之
不已刺三毛上各

一痛見血立已左刺右右刺左

謂大敦穴厥陰之井也

善悲驚不

樂刺如右方

善悲驚不樂亦如上法刺之

邪客於手陽明之絡令人

耳聾時不聞音

以其經支者從缺盆上頸貫頰又其絡支別者入耳會於宗脉故病令人耳聾

時不聞聲

刺手大指次指爪甲上去端如韭葉各一痛立聞

亦同前商陽穴

不已刺中指爪甲上與肉交者立聞

謂中衝穴

井也在手中指之端去爪甲如韭葉陷者中刺可入同身寸之一分留三呼若灸者可灸三壯古經脫簡無絡

可尋之恐是刺小指爪甲上與肉交者也何以言之下文云手少陰絡會於耳中也若小指之端是謂少衝手

少陰之井刺可入同身寸之一分留一呼若灸者可灸一壯
新校正云按王氏云恐是小指爪甲上少衝穴

按甲乙經手心主之正上循喉嚨出耳後合少陽完骨之下如是則安得不刺中衝而疑為少衝也
其不

時聞者不可刺也

不時聞者絡氣已絕故不可刺

耳中生風者亦刺之

如此數左刺右右刺左凡痺往來行無常處者在分肉

間痛而刺之以月死生為數用針者隨氣盛衰以為痛

數針過其日數則脫氣不及日數則氣不寫左刺右右

刺左病已止不已復刺之如法

言所以約月死生為數者何以隨氣之盛衰也

月生一日一痛二日二痛漸多之十五日十五痛十六

日十四痛漸少之

如是刺之則無過數無不及也

邪客於足陽明之經

令人軌衄上齒寒

以其脉起於鼻交頤中下循鼻外入上齒中還出俠口環唇下交承漿却

循頤後下廉出大迎循頰車上耳前故病令人軌衄上齒寒也復以其脉左右交於面部故舉經脉之病以明

繆處之類故下文云新校正云按全元起本與甲乙經陽明之經作陽明之絡刺足中指次

指爪甲上與肉交者各一痛左刺右右刺左

中當為大亦傳寫中

大之誤也據靈樞經孔穴圖經中指次指爪甲上無穴當言刺大指次指爪甲上乃厲兌穴陽明之井不當更有次指二字也厲兌者刺可入同身寸之一分留一呼若灸者可灸一壯新校正云按甲乙經云刺足中指爪甲上無次指二字蓋以大指次指為中指義與王注同下文云足陽明中指爪甲上亦謂此穴也厲兌在足大指次指之端去爪甲角如韭葉邪客於足少陽之絡令人脇痛不得

息欬而汗出

以其脉支別者從目銳眥下大迎合手少陽於頰下加頰車下頸合缺盆以下胃中

貫鬲絡肝膽循脇故令人脇痛欬而汗出刺足小指次指爪甲上與肉交者

各一痛

謂竅陰穴少陽之井也刺可入同身寸之一分留一呼若灸者可灸三壯 新校正云按甲乙

經竅陰在足小指次指之端去爪甲角如韭葉

不得息立已汗出立止欬者溫

衣飲食一日已左刺右右刺左病立已不已復刺如法

邪客於足少陰之絡令人噤痛不可內食無故善怒氣

上走貴上

以其經支別者從肺出絡心注胃中又其正經從腎上貫肝鬲入肺中循喉嚨俠舌本故

病令人噤乾痛不可內食無故善怒氣上走貴上也貴謂氣奔也 新校正云詳王注以貴上為氣奔者非按

難經胃為貴門楊玄操云貴鬲也是氣上走鬲上也經既云氣上走安得更以貴為奔上之解邪

刺足

下中央之脉各三痛凡六刺立已左刺右右刺左

謂湧泉穴

少陰之井也在足心陷者中屈足踳指宛宛中刺
可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸三壯 噤中

腫不能內唾時不能出唾者刺然骨之前出血立已左

刺右右刺左

亦足少陰之絡也以其絡並大經循喉嚨故
爾刺之此二十九字本錯簡在邪客手足

少陰太陰足陽明之絡前今遷於此 新校正云詳王
注以其絡並大經循喉嚨差互按甲乙經足少陰之絡
並經上走心包少陰之經循喉嚨今王氏
之注經與絡交互當以甲乙經為正也 邪客於足太

陰之絡令人腰痛引少腹控眇不可以仰息

足太陰之絡從解合

陽明上貫尻骨中與厥陰少陽結於下髀而循尻骨內
入腹上絡噤貫舌中故腰痛則引少腹控於眇中也眇
謂季脇下之空軟處也受邪氣則絡拘急故不可以仰
伸而喘息也刺腰痛篇中無息字 新校正云詳王注

云足太陰之絡按甲乙經乃太陰之刺腰尻之解兩脚
正非絡也王氏謂之絡者未詳其旨

之上是腰俞以月死生為痛數發鍼立已左刺右右刺

左 胛骨間曰解當中有腰俞刺可入同身寸之二寸
新校正云按氣府論注作二分刺熱論注作二分

水穴篇注作二分熱穴篇注作二寸甲乙經作二寸

留七呼主與經同中腧孔穴經云左取右右取左穴當

中不應爾也次腰下俠尻有骨空各四皆主腰痛下髀

主與經同是足太陰厥陰少陽所結刺可入同身寸之

二寸留十呼若灸者可灸三壯脾謂兩髀脾也腰俞髀

脾皆當取之也

新校正云按此邪客足太陰之絡并

刺法一項已見刺腰痛篇中彼注甚詳此特多是腰俞

三字耳別按全元起本舊無此三字王氏頗知腰俞無

左右取之理而注之而不知全元起本舊無

邪客於足太陽之絡令人拘攣

背急引脇而痛

以其經從踝內左右別下貫脾合膈中故病令人拘攣背急引脇而痛 新校

正云按全元起本及甲乙經引脇而痛下更云內引心而痛

刺之從項始數脊椎俠

脊疾按之應手如痛刺之傍三痛立已

從項始數脊椎者謂從大椎數

之至第二椎兩傍各同身寸之一寸五分內循脊兩傍按之有痛應手則邪客之處也隨痛應手深淺即而刺之邪客在脊骨兩傍故言刺之傍也 邪客於足少陽之絡令人留於樞中

痛髀不可舉

以其經出氣街繞髀際橫入髀厭中故痛令人留於髀樞後痛解不可舉也樞謂髀

也刺樞中以毫鍼寒則久留鍼以月死生為數立已

樞髀

之後則環銑穴也正 在髀樞後故言刺髀樞後也環銑者足少陽脉氣所發刺可入同身寸之一寸留二十呼

若灸者可灸三壯毫鍼者第七鍼也新校正云按甲乙經環鉋在髀樞中氣穴論云在兩髀厭分中此經云

刺樞中而王氏以為髀樞之後者誤也治諸經刺之所過者不病則繆刺

之正言也經不病則邪在絡故繆刺之若耳聾刺手陽

明不已刺其通脉出耳前者手陽明謂前手大指次指去端如韭葉者也是謂商

陽據中謁孔穴圖經手陽明脉中商陽合谷陽谿偏歷四穴並主耳聾今經所指謂前商陽不謂此合谷等穴

也耳前通脉手陽明脉正當聽會之分刺可入同身寸之四分若灸者可灸三壯齒齲刺手陽明

不已刺其脉入齒中立已據甲乙流注圖經手陽明脉中商陽二間三間合谷陽谿

偏歷溫留七穴並主齒痛手陽明脉貫頰入下齒中足陽明脉循鼻外入上齒中也邪客於五藏

之間其病也脉引而痛時來時止視其病繆刺之於手

足爪甲上

各刺其井左取右右取左

視其脉出其血間日一刺一刺

不已五刺已

有血脉者則刺之如此數

繆傳引上齒齒唇寒痛視其

手背脉血者去之

若病繆傳而引上齒齒唇寒痛者刺手背陽明絡也

足陽明中

指爪甲上一痛手大指次指爪甲上各一痛立已左取

右右取左

謂第二指屬兌穴也手大指次指謂商陽穴手陽明井也鍼經曰齒痛不惡清飲取足陽

明惡清飲取手陽明

新校正云詳前文邪客足陽明刺中指次指爪甲上是誤刺次指二字當如此只言中

指爪甲上

邪客於手足少陰太陰足陽明之絡此五絡

乃是也

皆會於耳中上絡左角

手少陰真心脉足太陰脾肺足陽明

胃脉此五絡皆會於耳中而出絡左額角也

五絡俱竭令人身脉皆動而形

無知也其狀若尸或曰尸厥

言其卒冒悶而如死尸身脉猶如常人而動也然陰

氣盛於上則下氣熏上而邪氣逆邪氣逆則陽氣亂陽氣亂則五絡閉結而不通故其狀若尸也以是從厥而

生故或曰尸厥刺其足大指內側爪甲上去端如韭葉

謂隱白穴足太

陰之井也刺可入同身寸之一分留三呼若灸者可灸三壯

後刺足心

謂涌泉穴足少陰之井也

刺同前取後刺足中指爪甲上各一痛

謂第二指足陽明之井也刺同

前取厲兌穴法後刺手大指內側去端如韭葉

謂少商穴手太陰之井也刺可

入同身寸之一分留三呼若灸者可灸三壯

後刺手心主

謂中衝穴手心主之井也刺可入同

身寸之一分留三呼若灸者可灸一壯新校正云按甲乙經不刺手心主詳此五絡之數亦不及手心主而

此刺之是有六絡未會王冰少陰銳骨之端各一痛立相隨注之不為明辨之旨也

已謂神門穴在掌後銳骨之端陷者中手少陰之俞也刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸三壯

不已以竹管吹其兩耳

言使氣入耳中內助五絡令氣復通也當內管入耳以手密撼

之勿令氣泄而極吹之氣感然從絡脉通也新校正云按陶隱居云吹其左耳極三度復吹其右耳三度也

鬢其左角之髮方一寸燔治飲以美酒一杯不能飲者

灌之立已

左角之髮是五絡血之餘故鬢之燔治飲之以美酒也酒者所以行藥勢又灸上而內走

於心心主脉故以美酒服之

凡刺之數先視其經脉切而從之審其

虛實而調之不調者經刺之有痛而經不病者繆刺之

因視其皮部有血絡者盡取之此繆刺之數也

四時刺逆從論篇第六十四

新校正云按厥陰有餘至筋急目痛全元起本在第四

六卷春氣在經脉至篇末全元起本在第一卷

厥陰有餘病陰痺

痺謂痛也陰謂寒也有餘謂厥陰氣盛滿故陰發於外而為寒痺新校

正云詳王氏以痺為痛未通

不足病生熱痺

陰不足則陽有餘故為熱痺

滑則病

狐疝風瀦則病少腹積氣

厥陰脉循股陰入髦中環陰器抵少腹又其絡支別者循

脛上聳結於莖故為狐疝少腹積氣也
新校正云按楊上善云狐夜不得尿日出方得人之所病與狐同故

曰狐疝一曰狐疝謂三焦孤府為疝故曰狐疝
少陰有餘病皮痺隱軫不足病

肺痺
腎水逆連於肺母故也足少陰脉從腎上貫肝
滑

則病肺風疝瀦則病積洩血
以其正經入肺貫腎絡膀胱故為肺疝及積洩血也

太陰有餘病肉痺寒中不足病脾痺
脾主肉故如是
滑則病脾

風疝瀦則病積心腹時滿
太陰之脉入腹屬脾絡胃其支別者復從胃別上鬲注心

中故為脾疝心腹時滿也
陽明有餘病脉痺身時熱不足病心痺
胃

餘則上歸於心不足則心下痺故為是
滑則病心風疝瀦則病積時善驚

內經素問
十一

心主之脉起於胃中出屬心包下
鬲歷絡三焦故為心疝時善驚

太陽有餘病骨痺身

重不足病腎痺

太陽與少陰為表裏故有餘不足皆病歸於腎也

滑則病腎風

疝瘳則病積善時巔疾

太陽之脉交於巔上入絡腦下循脊絡腎故為腎風及巔病也

少陽有餘病筋痺脇滿不足病肝痺

少陽與厥陰為表裏故病歸於脾

滑則病肝風疝瘳則病積時筋急目痛

肝主筋故時筋急厥陰之脉上

出額與督脉會於巔其支別者從目系下頰裏故目痛

是故春氣在經脉夏氣在

孫絡長夏氣在肌肉秋氣在皮膚冬氣在骨髓中帝曰

余願聞其故岐伯曰春者天氣始開地氣始泄凍解冰

釋水行經通故人氣在脉夏者經滿氣溢入孫絡受血

皮膚充實長夏者經絡皆盛內溢肌中秋者天氣始收

腠理閉塞皮膚引急

引謂牽引以縮急也

冬者蓋藏血氣在中內

著骨髓通於五藏是故邪氣者常隨四時之氣血而入

客也至其變化不可為度然必從其經氣辟除其邪除

其邪則亂氣不生

得氣而調故不亂

帝曰逆四時而生亂氣柰

何歧伯曰春刺絡脉血氣外溢令人少氣

血氣溢於外則中不足故

少氣

新校正云按自春刺絡脉至今人目不明與診要經終論義同文異彼注甚詳於此彼分四時此分五

時然此有長夏刺肌肉之分而逐時各關刺秋
分之事疑此肌肉之分即彼秋皮膚之分也
春刺肌

肉血氣環逆令人上氣
血逆氣上故上氣
正云按經關春刺秋分
新校
春刺

筋骨血氣內著令人腹脹
內著不散故脹
夏刺經脉血氣乃竭

令人解休
血氣竭少故解休然不可名之也解休謂寒不寒熱不熱壯不壯弱不弱故不可名之也

夏刺肌肉血氣內却令人善恐
却閉也血氣內閉則陽氣不通故善恐
夏

刺筋骨血氣上逆令人善怒
血氣上逆則怒氣相應故善怒
新校正云按經關

秋刺經脉血氣上逆令人善忘
血氣上逆滿於肺中故善忘
秋

刺絡脉氣不外行
新校正云按別本作血氣不行全元起本作氣不衛外太素同
令人

卧不欲動

以虛甚故按經闕秋刺

新校正云長夏分

秋刺筋骨血氣內散

令人寒慄

血氣內散則中氣虛故寒慄

冬刺經脉血氣皆脫令人目

不明

以血氣無所營故也

冬刺絡脉內氣外泄留為大痺冬刺肌

肉陽氣竭絕令人善忘

陽氣不壯至春而竭故善忘新校正云按經闕冬刺秋分

凡

此四時刺者大逆之病

新校正云按全元起本作六經之病

不可不從也

反之則生亂氣相淫病焉

淫不次也不次而行如浸淫相染而生病也

故刺

不知四時之經病之所生以從為逆正氣內亂與精相

薄必審九候正氣不亂精氣不轉

不轉謂不逆轉也

帝曰善刺

五藏中心一日死其動為噫

診要經終論曰中心者環死刺禁論曰一日死其動

為噫中肝五日死其動為語

診要經終論曰中肝五日死其動為語

甲乙經語作欠

中肺三日死其動為欬

診要經終論曰中肺五日死刺

禁論曰中肺三日死其動為欬

中腎六日死

新校正云按甲乙經作三日死

其動為噦

欠診要經終論曰中腎七日死刺禁論曰中腎六日死其動為噦

新校正云按甲乙經無欠字

中脾

十日死

新校正云按甲乙經作十五日

其動為吞

診要經終論曰中脾五日死刺禁論曰中

脾十日死其動為吞然此三論皆歧伯之言而死日動變不同傳之誤也

刺傷人五藏必死

其動則依其藏之所變候知其死也

變謂氣動變也中心下至此並為逆

從重
文也

標本病傳論篇第六十五

新校正云按全元起本
在第二卷皮部論篇前

黃帝問曰病有標本刺有逆從奈何岐伯對曰凡刺之
方必別陰陽前後相應逆從得施標本相移故曰有其
在標而求之於標有其在本而求之於本有其在本而
求之於標有其在本而求之於本故治有取標而得者
有取本而得者有逆取而得者有從取而得者

得病之
情知治

大體則逆從皆
可施必中焉

故知逆與從正行無間知標本者萬舉

萬當

道不疑惑識既深明則無問於人正行皆當

不知標本是謂妄行

識猶

道未高深舉且見違故行多妄

夫陰陽逆從標本之為道也小而大言

一而知百病之害

著之至也言別陰陽知逆順法明著見精微觀其所舉則小尋其所利則

大以斯明著故言一而知百病之害

少而多淺而博可以言一而知百也

言少可以貫多舉淺可以料大者何法之明故非聖人之道孰能至於是耶故學之者猶可以言一而知百病

也博

以淺而知深察近而知遠言標與本易而勿及

事雖

極深玄人非咫尺畧以淺近而悉貫之然標本之道雖易可為言而世人識見無能及者

治反為逆治

得為從先病而後逆者治其本先逆而後病者治其本

先寒而後生病者治其本先病而後生寒者治其本先

熱而後生病者治其本先熱而後生中滿者治其標先

病而後泄者治其本先泄而後生他病者治其本必且

調之乃治其他病先病而後生中滿者治其標先中滿

而後煩心者治其本人有客氣有同氣

新校正云按全元起本同作固

小大不利治其標小大利治其本

本先病標後病必謹察之

病發而

有餘本而標之先治其本後治其標病發而不足標而

本之先治其標後治其本

本而標之謂有先病復有後病也以其有餘故先治其本

後治其標也標而本之謂先發輕微緩者後發
重大急者以其不足故先治其標後治其本也謹察間

甚以意調之

間謂多也甚謂少也多謂多形證而輕易少謂少形證而重難也以意調之謂審量

標本不足有餘非謂捨法而以意妄為也

間者并行甚者獨行先小大不利

而後生病者治其本

并謂他脉共受邪氣而合病也獨謂一經受病而无異氣相參也并

甚則相傳傳急則亦死

夫病傳者心病先心痛

藏真通於心故心先痛

一日

而欬

心火勝金傳於肺也肺在變動為欬故爾

三日脇支痛

肺金勝木傳於肝也以其脉循

脇肋故如是

五日閉塞不通身痛體重

肝木勝土傳於脾也脾性安鎮木氣乘之

故閉塞不通身痛體重

三日不已死

以勝相伐唯弱是從五藏四傷宜其能久故為即死冬

夜半夏日中

謂正子午之時也或言冬夏有異非也晝夜之半事甚昭然 新校正云按靈樞經

夫氣入藏病先發於心一日而之肺三日而之肝五日而之脾三日不已死冬夜半夏日中甲乙經曰病先發

於心心痛一日之肺而欬三日之肝肋支痛五日之脾閉塞不通身病體重三日不已死冬夜半夏日中詳素

問言其病靈樞言其藏甲乙經乃并素肺病喘欬藏真高於

問靈樞二經之文而病與藏兼舉之

肺而主息三日而脇支滿痛肺傳於肝一日身重體痛肝傳於脾

五日而脹自傳於府十日不已死冬日入夏日出孟冬之中日入於申

之八刻三分仲冬之中日入於申之七刻三分季冬之中日入於申與孟月等孟夏之中日出於寅之八刻一分仲夏之中日出於寅七刻三分季夏之中日出於寅與孟月等也肝病頭目眩脇支滿

藏真散於肝脉內
連目脇故如是

三日體重身痛

肝傳於肺

五日而脹

自傳於府

三日腰脊少腹痛脛痠

謂胃傳於腎以其脉起於足循膈內出臍內廉上股內後廉貫

脊屬腎絡膀胱故如是也腰為腎之府故腰痛

三日不已死冬日入

新校正云按甲乙經

作日夏早食

日入早晏如冬法也早食謂早於食時則卯正之時也

脾病身痛體

重

藏真濡於脾而主肌肉故爾

一日而脹

自傳於府

二日少腹腰脊痛脛

痠

胃傳於腎

三日背脇筋痛小便閉

自傳於府及之脇也

十日不已死

冬人定夏晏食

人定謂申後二十五刻晏食謂寅後二十五刻

腎病少腹腰脊

痛筋骨痠

藏真下於腎故如是

三日背脇筋痛小便閉

自傳於府

新校正云按

靈樞經云之胆膀胱是自傳於府及之胆也

三日腹脹

膀胱傳於小腸
校正云按甲乙經云新

三日之上之心脈

三日兩脇支痛

府傳於藏
新校正云按靈樞經云三日之小腸三日上

之心今云兩脇支痛是小腸府傳心藏而發痛也

三日不已死冬大晨夏晏晡

大晨謂寅後九刻大明之時也
晏晡謂中後九刻向昏之時也

胃病脹滿

以其脈循腹故如是

五

日少腹腰脊痛筋骨痠

胃傳於腎

三日背胆筋痛小便閉

自傳於府

及之**五日身體重**

膀胱水府傳於脾也
靈樞經云及甲乙經各云五日上之

新校正云按

心是膀胱傳心為相勝而身體重今王氏言傳脾者誤也

六日不已死冬夜半後夏

日眈
夜半後謂子後八刻丑正時也
日眈謂午後八刻未正時也

膀胱病小便閉

其

為津液之府故爾

五日少腹脹腰脊痛骭痠

自歸於藏

一日腹脹

腎復

傳於小腸一日身體痛

小腸傳於脾云一日上之心是府傳於藏也

新校正云按靈樞經甲乙

經作之脾與王注同

二日不已死冬雞鳴夏下晡

雞鳴謂早雞鳴丑正之分也下

晡謂日下於晡時申之後五刻也

諸病以次是相傳如是者皆有死期

不可刺

五藏相移皆如此有緩傳者有急傳者緩者或一歲二歲三歲而死其次或三月若六月而死

急者一日二日三日四日或五六日而死則此類也尋此病傳之法皆五行之氣考其日數理不相應夫以五

行為紀以不勝之數傳於所勝者謂火傳於金當云一日金傳於木當云二日木傳於土當云四日土傳於水

當云三日水傳於火當云五日也若以已勝之數傳於不勝者則木三日傳於土土五日傳於水水一日傳於

火火二日傳於金金四日傳於水經之傳日似法三陰
三陽之氣玉機真藏論曰五藏相通移皆有次不治三
月若六月若三日若六日傳而當死此與同
也雖爾猶當臨病詳視日數方悉是非爾
閒一藏止

新校正云按甲
乙經无止字
及至三四藏者乃可刺也
閒一藏止者
謂隔過前一

藏而不更傳也則謂木傳土土傳水水傳火火傳金金
傳木而止皆間隔一藏也及至三四藏者皆謂至前第
三第四藏也諸至三藏者皆是其已不勝之氣也至四
藏者皆至已所生之父母也不勝則不能為害於彼所
生則父子無剋代之期
氣順以行故刺之可矣

黃帝內經素問卷十八

黃帝內經素問卷十八音釋

繆刺論頤

反之六

齒

丘禹反

髻

音易

標本病傳論眦

徒結反

黃帝內經素問卷十八音釋